

GUÍA
DE LAS
Aves
DEL
CHACO
SECO
PARAGUAYO



CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA



GUYRA
PARAGUAY

GUÍA DE LAS *Aves* DEL CHACO SECO PARAGUAYO

Arne Jent Lesterhuis
Diego Bueno Villafañe
Hugo Enrique Cabral Beconi
Viviana Beatriz Rojas Bonzi



CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA



GUYRA
PARAGUAY

Cita recomendada:

Lesterhuis AJ, Bueno Villafañe D, Cabral H, Rojas V. 2018. Guía de Aves del Chaco seco paraguayo. Guyra Paraguay. Asunción, Paraguay. 96 pp.

Revisores: Hugo del Castillo y Paul Smith.

Diseño: Sofía Argüello

Fotografía de portada: *Rhynchospiza strigiceps* (Hugo Cabral)
Eudromia formosa y *Spiziapteryx circumcincta* (Arne Lesterhuis)



CONSEJO NACIONAL
**DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA**



"Este Proyecto es financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEI" (14-INV-209)

Junio 2018

©Todos los derechos reservados

Permitida la reproducción total o parcial con cita de autores.

ISBN: 978-99967-653-4-6

Aves DEL CHACO SECO

CONTENIDO

PRÓLOGO	7
INTRODUCCIÓN	9
EL HÁBITAT	10
AVIFAUNA CHAQUEÑA	13
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL CHACO PARAGUAYO	13
TOPOGRAFÍA DEL AVE	16
GUÍA DE TAMAÑOS	16
CÓMO USAR LA GUÍA DE ESPECIES	17
FICHAS DE ESPECIES	18
AGRADECIMIENTOS	81
GLOSARIO	82
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	83

PRÓLOGO

Aves del Chaco seco viene a completar una serie de publicaciones de Guyra Paraguay que supera la veintena de obras coincidentemente con más de 20 años de existencia. Las ecorregiones del Paraguay, dimensiones ecológicas a las que Guyra Paraguay contribuyó hasta tener una resolución que valide el conocimiento técnico y científico, albergan una rica y distintiva fauna en general y avifauna en particular. Dada la situación particular del país en el que convergen diferentes ecorregiones, el Chaco tiene su corazón en lo que llamamos Chaco seco, una zona que se diferencia del Chaco Serrano más al oeste y del Chaco Húmedo más hacia al este. Coincidentemente con esta situación, es el Chaco seco el ambiente que está recibiendo mayores presiones sobre su ambiente natural, pasando en un ritmo que no se desacelera, de bosques y tierras forestales, a áreas habilitadas para ganadería principalmente, aunque también algo de agricultura. Los cambios al uso de la tierra se dan muy aceleradamente y estamos perdiendo hábitats naturales y consecuentemente la diversidad biológica que alberga. Uno de los esfuerzos de Guyra Paraguay para dar a conocer y concientizar sobre la rica naturaleza del país es a través de guías de campo. Presentamos aquí una nueva guía para que todos conozcamos parte de la rica avifauna del Chaco seco. El equipo de Guyra Paraguay se ha esmerado para seleccionar las 125 especies de las aves más representativas del Chaco seco, con el fin de poder asistir en la identificación de las mismas, fomentando el conocimiento, el estudio y conservación de especies de aves en el Paraguay. Queremos que la guía sea una herramienta, tanto de campo para identificar, como también del aula para educar, y esperamos que sea de la familia, en el hogar para que todos conozcamos y amemos el acervo natural de esta tierra. Queremos que esta guía brinde la información necesaria para que los trabajadores que hacen de una u otra manera conservación, puedan también disponer de una herramienta ágil y actualizada, por ello hemos incorporado información sobre el estado de conservación de las especies a nivel nacional e internacional, el hábitat donde se las puede encontrar, su tipo de migración, alimentación y un mapa de los registros hasta la fecha. Honrados de que usted pueda utilizarla y tenerla con usted, y satisfecho por una contribución más a la biodiversidad del Paraguay, esperamos sus comentarios y sugerencias para ir mejorando estos materiales que con esfuerzo profesional del equipo y el apoyo de nuestros donantes podemos hoy dar a conocer.

Dr. Alberto Yanosky

INTRODUCCIÓN

El "Gran Chaco Americano" incluye al Chaco seco y Húmedo (*sensu* Dinerstein *et al.*, 1995) y es una extensa región de diversas formaciones vegetales, como bosques, sabanas, palmares, entre otras; que abarca el sureste de Bolivia, el oeste de Paraguay y norte de Argentina, y una pequeña porción de Brasil. Posee los bosques naturales más extensos de Sudamérica luego del Amazonas, por lo que es extrema importancia en el Cono Sur del continente. En el Paraguay, el Chaco incluye dos eco-regiones: el Chaco seco y el Chaco húmedo; y es vecino al Pantanal. El Chaco seco ocupa el oeste y el centro de la Región Occidental en Paraguay (Dinerstein *et al.* 1995)

El Chaco representaba una de las últimas grandes áreas silvestres no perturbadas de América Latina, con ecosistemas intactos a nivel de paisaje y reducido cambio en la cobertura forestal original. Sin embargo, debido a su alto potencial agro-ganadero, la expansión de la agricultura y la ganadería en el Gran Chaco Americano, especialmente en Paraguay ha ejercido una creciente presión sobre sus ecosistemas naturales en los últimos años (Hansen *et al.* 2013, Vallejos *et al.* 2015, Kuemmerle *et al.* 2017). A pesar que el Gran Chaco Americano ha sido considerado como un área prioritaria para la conservación (Frate *et al.* 2015) solo el 9% de la superficie del Gran Chaco se encuentra actualmente protegida (Nori *et al.* 2016, Kuemmerle *et al.* 2017) y si bien en Paraguay existen extensas áreas protegidas en el Chaco seco, abarcando aproximadamente 1.500.000 ha, ésta cifra representa sólo una pequeña fracción del territorio y los ecosistemas chaqueños paraguayos.

El Chaco seco como ecorregión se caracteriza por su alta biodiversidad y endemismos, albergando más de 400 especies de aves (BDGP 2018), haciéndola un área clave para su conservación. En el año 2008, los tres parques nacionales más importantes del Chaco seco, el Parque Nacional Médanos del Chaco, PN Defensores del Chaco y el PN Teniente A. Enciso, fueron declaradas Áreas de Importancia para las Aves (IBAs) debido a su importancia para la conservación de especies clave como el águila coronada (*Buteogallus coronatus*), la copetona (*Eudromia formosa*), la charata (*Ortalis canicollis*), el charlatán (*Dolichonyx oryzivorus*), entre otras (Guyra Paraguay 2008).

Guyra Paraguay desarrolla esta Guía de las Aves del Chaco seco, producto del proyecto "Evaluación de la importancia

de los Parques Nacionales del Chaco seco como refugio natural para las aves amenazadas y endémicas del Paraguay" (14-INV-209), financiado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT). Con ello se busca evaluar la importancia de estas áreas protegidas como refugio natural para la conservación de la avifauna del Chaco seco, a través de mecanismos y estrategias de monitoreo e investigación. Esta guía permitirá difundir a nivel local y nacional la importancia de esta ecorregión para la avifauna chaqueña.

La presente Guía tiene como objetivo ser una herramienta para la identificación 125 especies de las aves más representativas del Chaco seco, fomentando el conocimiento, el estudio y conservación de las aves en el Paraguay. Esta Guía de campo contiene información sobre el estado de conservación de las especies a nivel nacional e internacional, el hábitat donde se la puede encontrar, su temporalidad, alimentación, comportamiento y un mapa de los registros hasta la fecha. La nomenclatura y nombres en inglés de esta guía sigue a South American Classification Committee (SACC), los nombres comunes a la Checklist de Aves del Paraguay (Guyra Paraguay, 2004). Las descripciones de especies están basadas en Canevari *et al.*, (1991), Narosky & Yzuerieta (2006) y observaciones de campo de los autores de esta obra.

EL HÁBITAT

El Chaco seco es una vasta llanura sedimentaria, modelada por la acción de los ríos que la atraviesan en sentido noroeste-sudeste, principalmente el Bermejo y Pilcomayo, los cuales transportan gran cantidad de sedimentos desde sus altas cuencas. Esta llanura, alberga también serranías, llegando a más de 600 m.s.n.m. en el Cerro Cabrera Timane y el Cerro León. Presenta un gradiente de precipitaciones con isohietas de 800 mm/año al este, hasta unos 600 mm/año hacia el oeste en su límite con los Médanos. Así, las lluvias estacionales forman lagunas que llenan los paleocauces, proveyendo fuente de agua para la fauna chaqueña. El Chaco seco se caracteriza también por climas extremos que oscilan entre los 48 °C y -5 °C en el invierno seco.

El tipo de vegetación dominante es el bosque xerofítico, es decir bosques abiertos, bajos y espinosos con matorrales o arbustales bien desarrollados. Árboles característicos del área incluyen a especies como el Quebracho blanco (*Aspidosperma quebracho-blanco*), el Samu'u (*Ceiba chodatii*), el Palo Santo (*Bulnesia sarmientoi*), Algarrobo blanco (*Prosopis alba*), Algarrobo negro (*P. nigra*), entre otras. El extremo noroeste de esta región se sitúa la formación denominada Médanos del Chaco, con una superficie de 7.576,80 Km², la cual se caracteriza por la presencia de los médanos arenosos, formaciones de arenas en un 100% de origen eólico, de





Figura 1. Áreas Silvestres Protegidas. (a) Parque Nacional Tte. A. Enciso, (b) Parque Nacional Médanos del Chaco y (c) Parque Nacional Defensores del Chaco. Comparativo de cobertura agropecuaria de los años 2000 - 2017 en la ecorregión Chaco seco. Fuente: Guyra Paraguay, 2018.



| **Charata** (*Ortalis canicollis*). Arne Lesterhuis

grano fino, proveniente de los sedimentos arenosos de los ríos Grande y Parapití en Bolivia.

Los valores de precipitación en esta eco-región son los menores del país: 400-500 mm/año, en forma muy discontinua, concentrada en los primeros meses del año. La temperatura media anual es de 25°C. La fisionomía de la vegetación de los médanos es la de una sabana con árboles y arbustales dispersos con una altura que no sobrepasa los 10 m y de cobertura discontinua. Esta cobertura, en general caducifolia a semi-caducifolia con grandes campos con herbáceas se caracteriza por las siguientes especies: *Aspidosperma piryfolium*, *Schinopsis cornuta*, *Sch. heterophylla*, *Jacaranda mimosifolia*, *Pterogyne nitens*, *Tabebuia aurea*, *Cochlospermum tetraporum*, *Agonandra excelsa*, *Chloroleucon chacoense*, *Elionurus muticus*, *Arachis batizocoi*, *Stachytarphetta* sp., *Gymnocalycium megatae*, *Pfaffia fruticulosa*, *Alternanthera* sp., entre otras (Mereles *et al.* 2013).



| **Saria patas negras** (*Chunga burmeisteri*). Arne Lesterhuis.

AVIFAUNA CHAQUEÑA

La avifauna del Chaco seco se caracteriza por albergar aves altamente adaptadas al ambiente de matorral espinoso árido, así como una gran variedad y abundancia de aves acuáticas que aprovechan las lluvias temporales (Guyra Paraguay 2005).

En total, más de 400 especies de aves se han registrado en el Chaco seco de Paraguay (BDGP 2018), incluyendo 18 especies endémicas (Tabla 1) que no se encuentran en otros tipos de hábitat, como el carpintero negro (*Dryocopus schulzi*), el halconcito gris (*Spizapteryx circumcincta*), la copetona (*Eudromia formosa*), saria patas negras (*Chunga burmeisteri*), el poco conocido chingolo corona castaña (*Rhynchospiza strigiceps*), el soldadito (*Lophospingus pusillus*), entre otras (Guyra Paraguay 2004). De estas, ocho especies que ocurren en el Chaco seco se encuentran en un estado de preocupación a nivel internacional, entre ellas el ñandu (*Rhea americana*), el doradito pardo (*Pseudocolaptes dinelliana*), el tachuri canela (*Polystictus pectoralis*), el flamenco (*Phoenicopterus chilensis*), el cóndor (*Vultur gryphus*), el águila coronada (*Buteogallus coronatus*), el carpintero negro (*D. schulzi*), y el capuchino garganta café (*Sporophila ruficollis*) (BirdLife International 2018).

Debido a las constantes presiones de cambio de uso de suelo las cuales se traducen en pérdida de hábitat y fragmentación en la región chaqueña, es probable que varias especies endémicas al Chaco seco enfrenten graves problemas de conservación si no son debidamente incorporadas estrategias para su protección como parte de la política de desarrollo sostenible.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL CHACO PARAGUAYO

Entre los años 2010 – 2015, Paraguay ha sido uno de los países con mayor reducción de bosque a nivel mundial (FAO 2015). Más del 80% de esta transformación se dio en la región occidental del país (PNC ONU-REDD+ 2016), principalmente debido a la implantación de pasturas exóticas para cría y engorde de ganado y en menor medida para uso agrícola (Arévalos *et al.* 2015).

Entre las ecorregiones más amenazadas se encuentra el Chaco seco, que debido a sus características edafoclimáti-

Tabla 1. Aves endémicas del Chaco. Fuente: Guyra Paraguay, 2004.

Nombre científico	Endémicas (GP 2004)
<i>Nothoprocta cinerascens</i>	Perdiz de monte
<i>Eudromia formosa</i>	Copetona
<i>Ortalis canicollis</i>	Charata
<i>Spiziapteryx circumcincta</i>	Halconcito gris
<i>Chunga burmeisteri</i>	Saria patas negras
<i>Strix chacoensis</i>	Lechuza chaqueña
<i>Dryocopus schulzi</i>	Carpintero negro
<i>Campephilus leucopogon</i>	Carpintero lomo blanco
<i>Furnarius cristatus</i>	Hornerito copetón
<i>Tarphonomus certhioides</i>	Bandurrita chaqueña
<i>Drymornis bridgesii</i>	Chinchero grande
<i>Xiphocolaptes major</i>	Trepador gigante
<i>Rhinocrypta lanceolata</i>	Gallito copetón
<i>Pseudocolopteryx dinelliana</i>	Doradito pardo
<i>Knipolegus striaticeps</i>	Viudita chaqueña
<i>Saltatricula multicolor</i>	Pepitero chico
<i>Rhynchospiza strigiceps</i>	Cachilo corona castaña
<i>Microspingus melanoleucus</i>	Monterita cabeza negra

cas se ha caracterizado por ser una de las regiones óptimas para el rubro ganadero. Hasta el año 2017, esta ecorregión ha transformado el 33% de su bosque en pasturas implantadas (Figura 1). Por otro lado, la formación de los Médanos del Chaco ha logrado mantener casi el 95% de su cobertura natural; hasta diciembre del 2017 solo se ha registrado una superficie de 30.647 ha de cambio de uso de suelo. Esto puede estar ligado a las condiciones poco favorables para la expansión ganadera como lo son el difícil acceso al agua y la poca fertilidad de sus suelos arenosos. Es importante mencionar que el departamento de Boquerón, ubicada casi totalmente en la ecorregión del Chaco seco ha liderado la tasa de cambio de uso del suelo en el Gran Chaco Americano por varios años consecutivos (Arévalos *et al.* 2017).

En cuanto a las aves, la pérdida de hábitat es una de las principales amenazas a nivel global (BirdLife International 2018) y en la actualidad, las poblaciones y el área de distribución de muchas de las especies están disminuyendo debido a esta pérdida. Como resultado de este proceso de conversión de

hábitat natural, las aves del Chaco seco dependerán cada vez más de las áreas protegidas existentes para su sobrevivencia. En Paraguay existen extensas áreas protegidas en el Chaco seco, las cuales abarcan unas 1.500.000 ha. Los tres Parques Nacionales más importantes del Chaco seco en Paraguay, PN Médanos del Chaco (605.075 ha), PN Defensores del Chaco (720.723 ha) y PN Teniente A. Enciso (42.241 ha), son considerados como zonas núcleos de la Reserva de la Biosfera del Chaco Paraguayo, declarada en mayo 2001 por Decreto Presidencial N° 13.202/01 (SEAM 2017a,b,c).


Según varios autores existe una alta tasa de recambio (*turnover*) de especies en el área, cambiando la presencia/ausencia de especies de un área a otra a lo largo de un gradiente de estructura vegetación y humedad (Kratter *et al.* 1993, Zyskowski *et al.* 2003). Por ende, solo la conservación a gran escala, por ejemplo, a través de una red de áreas protegidas conectadas, podría ser la mejor estrategia poder mantener al Chaco y su biodiversidad (Zyskowski *et al.* 2003).

La Reserva de la Biosfera del Chaco Paraguayo, contiene un enorme potencial de conservación de aves gracias a sus tres importantes parques nacionales, las cuales fueron también designadas como Áreas de Importancia para las Aves (IBAs). La avifauna presente en los tres parques comprenden: 225 especies en el PN Médanos del Chaco, 317 en el PN Defensores del Chaco y 206 en el PN Tte. Enciso, totalizando 343 especies sin considerar las repetidas (BDGP 2018).

El Parque Nacional Médanos del Chaco (IBAPY001), creado por Decreto N.º 21.957/03, limita con el PN Defensores del Chaco y marca la transición entre los médanos y los bosques típicos del Chaco seco. Alberga 17 especies endémicas del chaco, así como especies de distribución restringida como el soldadito (*L. pusillus*) y el halconcito gris (*S. circumcincta*). Por otro lado, en el PN Defensores del Chaco (IBAPY002), creado por Decreto N.º 16.806, se caracteriza por ser una vasta llanura aluvial, atravesada de oeste a este por cañadas y cañadones ("madrejones") sujetos a inundaciones temporales. Cabe destacar que dentro del perímetro del parque se encuentra una muestra geológica única del Chaco, el Cerro León. En este importante parque se han registrado 16 especies endémicas del Chaco seco, entre ellas la perdiz de monte (*Nothoprocta cinerascens*) y la copetona (*E. formosa*). El PN Teniente A. Enciso (IBAPY003), creado por Decreto N.º 15.936, se caracteriza por ser bosque xerofítico, aunque las zonas norte y noroeste del parque constituyen parte del límite inferior de los médanos, protegiendo también una muestra interesante de esta formación ecológica. En este parque se han registrado 16 especies endémicas del Chaco seco (Guyra Paraguay 2008).

LEYENDA

TOPOGRAFÍA DEL AVE



GUÍA DE TAMAÑOS

AVE GRANDE

Mayor a 32cm
(rapaces, charatas, algunas perdices)

AVE MEDIANA

Entre 20 y 32 cm
(palomas, cotorras, algunas perdices)

AVE PEQUEÑA

Menor a 20 cm
(picaflores, gorriones, semilleros, horneros)

CÓMO USAR LA GUÍA DE ESPECIES

ABUNDANCIA



Abundante



Común



Frecuente



Escaso



Raro

HÁBITAT



Bosque xerofítico
chaqueño (alto y bajo)



Matorral



Áreas convertidas
Pasturas
Sabanas



Humedales



Poblados

COMPORTAMIENTO SOCIAL



Solitario



Pareja



Gregario



Combinado



NIDIFICACIÓN



Nidifica en la Ecoregión



No nidifica en la Ecoregión

ESTADO DE CONSERVACIÓN INTERNACIONAL UICN 2018

CR

En peligro crítico de extinción

EN

En peligro de extinción

VU

Vulnerable

NT

Casi amenazada

LC

Preocupación menor

ESTADO DE CONSERVACIÓN NACIONAL*

EN

En peligro de extinción

AE

Amenazada de extinción

OCURRENCIA

R

Residente

N

Migrador neártico

AM

Migrador austral

AN

Migrador austral norteño

AS

Migrador austral sureño

ALIMENTACIÓN



Granívoros



Folívoros



Detritívoros



Insectívoros



Carnívoros



Nectívoros



Frugívoros

Según Resolución SEAM N° 2242/06 Por la cual se aprueba el listado de las especies protegidas de la vida silvestre amenazadas de extinción y Resolución SEAM N° 2243/06 Por la cual se actualiza el listado de especies protegidas de la vida silvestre en peligro de extinción.

FICHAS DE ESPECIES

Crypturellus undulatus

Tataupa listado - Inambu kogoe – Undulated Tinamou

IDENTIFICACIÓN:

Perdiz de tamaño mediano; dorso, cuello y pecho gris con fino barrado. Cubiertas grisáceas, resto ventral ocrácea. Piernas y abdomen, canela barrado de oscuro. Patas verdosas y pico negruzco.

ESPECIES SIMILARES:

El Tataupa común (*Crypturellus tataupa*) y Tataupa chico (*Crypturellus parvirostris*) ambos tienen una apariencia similar y ocurren en el Chaco seco, siendo al Tataupa común el más común de los dos. Una diferencia clave es el *plumaje fino barrado* del Tataupa listado y el plumaje sin barrado del Tataupa común y Tataupa chico.


COMPORTAMIENTO:

Más oído que visto. Silbido melancólico e insistente. Terrestre, forrajea por el piso en el sotobosque, a veces en áreas más abiertas. Vuela solo si se siente amenazada.

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Paul Smith

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Nothoprocta cinerascens

Perdiz del monte - Inambu sísí – Brushland Tinamou

IDENTIFICACIÓN:

De tamaño mediano; semicopete negruzco eréctil, pecho con pecas blancas y resto del ventral blancuzco, levemente barrado grisáceo, patas rosadas y dorso gris pardusco con dibujos blanquecinos, canela y negruzco.

ESPECIES SIMILARES:

La Perdiz chica (*Nothura maculosa*) y la Perdiz chaqueña (*Nothura boracquirea*) muestran alguna similitud, pero son menores en tamaño, y de color más acanelado. La Copetona (*Eudromia formosa*) es más grande, con copete más largo y notable. Además, tiene la cara y el cuello marcado por dos líneas blancas (ausentes en la Perdiz de monte).

COMPORTAMIENTO:


El canto es una serie de 7 u 8 silbos melancólicos iguales. Al levantar vuelo emite un fuerte ruido de alas. Terrestre, solitario, forrajea por el piso en el sotobosque, a veces en áreas más abiertas. Generalmente visto al cruzar las rutas.

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ENDÉMICO

ESTADO **LC**



© Paul Smith

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Nothura boraquira

Perdiz chaqueña – Ynambu boli – White-bellied Nothura

IDENTIFICACIÓN:

Perdiz de tamaño mediano/ pequeño. Garganta blanca, plumaje de tonos grises con canela, flancos rayados y resto del ventral acanelado. Semicopete eréctil negruzco. En vuelo, mancha alar en herradura. Patas cortas y bien amarillas.

ESPECIES SIMILARES:

La perdiz chica (*Nothura maculosa*) y la Perdiz de monte (*Nothoprocta cinerascens*) muestran alguna similitud. *N. cinerascens* es más grande, más parda y de patas grisáceas. *N. maculosa* posee patas menos amarillas y semicopete poco visible.

COMPORTAMIENTO:

Silbido repetido *peeeeeee* entrecortado al levantar vuelo. Generalmente una postura agachada. Terrestre y forrajea por el piso principalmente en áreas más abiertas como pasturas y pastizales.

MEDIANO

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Andy Holman

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Nothura maculosa

Perdiz chica – Ynambu'i – Spotted Nothura

IDENTIFICACIÓN:

Perdiz de tamaño mediano/ pequeño; Cabeza, cuello y pecho ocre, estriados. Garganta blanca. Ventral acanelada y flancos barrados. Las primarias son maculadas en ambos vexilos, notable en vuelo. Patas cortas y de color amarillo claro, a veces estirando a rosado.

ESPECIES SIMILARES:

La perdiz chaqueña (*Nothura boraquira*) y la perdiz de monte (*Nothoprocta cinerascens*) muestran alguna similitud, siendo *N. cinerascens* más grande, pardusca y de patas grisáceas. *N. boraquira* posee patas mucho más amarillas y un semicopete más visible.


COMPORTAMIENTO:

Terrestre. Vuelo ruidoso, súbito, bajo, parabólico y no largo. Frecuentemente observado a los lados de las rutas buscando alimento, cruzando caminos sin prisa. Silbos aflautados que aceleran al final.

MEDIANO

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Arne Lesterhuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Eudromia formosa

Copetona – Ynambu apirati – Quebracho Crested-Tinamou

IDENTIFICACIÓN:

Perdiz de tamaño grande con un notable copete largo y fino. Plumaje en general acanelado. Dorso con pequeñas manchas ocre espaciadas. Dos notables líneas blancas bajan por el cuello desde la cara. Garganta blanca. Partes ventrales de color ocráceo manchado. Patas de color gris claro.

ESPECIES SIMILARES:

Comparte algo de similitud con la Perdiz de monte (*Nothoprocta cinerascens*), pero es más grande. Además, la Perdiz de monte tiene un copete más corto y carece las dos líneas blancas en la cara y el cuello.

COMPORTAMIENTO:

Vocaliza durante todo el día, pero más durante la madrugada o atardecer. Emita un lento y descendiente silbado *foooo-ip foo-ip*. Terrestre, social, forrajea por el piso en el sotobosque, a veces en áreas más abiertas. Generalmente visto al cruzar las rutas (durante el día o de noche).

GRANDE

OCURRENCIA **R**

ENDÉMICO

ESTADO **LC**



© Arne Lesthuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Ortalis canicollis

Charata – Jaku karaguata – Chaco Chachalaca

IDENTIFICACIÓN:

Pava de monte con un plumaje parduzco en términos generales. Cabeza, pecho y cuello cenicientos. El dorso es algo oliváceo y ventral ocráceo. El subcaudal y las timoneras externas de color rufo (más notable en vuelo cuando abre la cola). Zona ocular y gular rojiza.

ESPECIES SIMILARES:

Es la única Pava de monte en el Chaco seco, difícil de confundir con otras especies.

COMPORTAMIENTO:

Ruidosos y llamativas gritos grupales *Cha..cha..la..có..*, fuerte y ronco. También una serie de *uit..* como un carpintero. Terrestre y arborícola, en pareja o grupos, raras veces solitario.

GRANDE

OCURRENCIA **R**

ENDÉMICO

ESTADO **LC**



© Guillermo Menéndez

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Cathartes aura

Cuervo cabeza roja – Yryvu akâ virâi – Turkey Vulture

IDENTIFICACIÓN:

Cuervo grande y de color negro dominante. En vuelo, alas en V abierta. Cabeza y cuello rojizos, nuca blanca contrastante. Notables remeras ventrales cenicientas (parecen blancos en vuelo). Cola redondeada o en abanico.

ESPECIES SIMILARES:

En vuelo se puede confundir con el Aguilucho negro, pero es más chico que el Cuervo cabeza roja y en la cola tiene tres fajas blancas el Aguilucho negro.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente observado planeando alto en el cielo o posados a lo largo de caminos. Frecuentemente con las alas abiertas absorbiendo el calor del sol.

GRANDE
OCURRENCIA R
ESTADO LC


© Nelson Pérez

NIDIFICACIÓN

ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN

HÁBITAT


Sarcoramphus papa

Cuervo real – Yryvu ruvicha – King Vulture

IDENTIFICACIÓN:

Cuervo grande con coloración llamativa. Cuerpo blanco, alas anchas con cubiertas cremosas. Remeras y corta cola negra. Cabeza y cuello coloridos, carúncula anaranjada. Collar de plumas plumizo. Iris notablemente blanco. Juveniles e inmaduros son predominantemente de color gris oscuro.

ESPECIES SIMILARES:

En vuelo los adultos pueden ser confundidos por el Tuyuyu (*Mycteria americana*) y la Cigüeña americana (*Ciconia maguari*), ambos dominantes blanco con remeras negras, pero con cuello y patas largas.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente observado planeando alto en círculos utilizando térmicas para mantener su altitud sin la necesidad de batir sus alas. Puede estar acompañado por las otras especies de cuervos.

GRANDE
OCURRENCIA R
ESTADO EN LC



© Paul Smith

NIDIFICACIÓN

ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN

HÁBITAT


Chondrohierax uncinatus

Milano pico garfio – Hook-billed Kite

IDENTIFICACIÓN:

Dimorfismo. Ambos sexos con pico muy ganchudo y una mancha amarilla frente al ojo. Macho de color plumizo. Cola negra con dos bandas claras. Fino barrado ventral de color blanco. Remeras ventrales barradas de blanco y negro. La hembra tiene un dorso pardo, nuca y barrado ventral canelas. Existe una fase negra/oscura que puede ocurrir en ambos sexos.

GRANDE

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Arne Lestehuis



© Alec Earnshaw

ESPECIES SIMILARES:

Se podría confundir la especie con el Gavilán patas largas (*Geranospiza caerulescens*) y el Aguilucho gris (*Buteo nitidus*), ya que ambos tienen un plumaje plumizo con fino barrado ventral. El Gavilán patas largas es más grande, con cola más larga y con mucho blanco. El Aguilucho gris es un poco más chico, tiene patas bien amarillas y finamente barrado en la parte dorsal.

COMPORTAMIENTO:

Es una rapaz confiada, pero oculta y pasiva. Silbo musical, *he...tetetete...*. Consume principalmente caracoles.

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Ictinia mississippiensis

Milano boreal – Syi syi – Mississippi Kite

IDENTIFICACIÓN:

Rapaz delgada. Plumaje de color plumizo, más oscuro en la parte dorsal. Alas largas y finas con primarias negras (sin rufo). Ápice de remeras internas blanco, visible claramente en vuelo. Cola negra (sin barras). Juvenil con ventral estriado de castaño. Cola barrada.

GRANDE

OCURENCIA **N**

ESTADO **LC**



© Jorge La Grotteri

ESPECIES SIMILARES:

El Milano plumizo (*Ictinia plumbea*) es muy parecida y comparte además un mismo comportamiento. La diferencia principal es la mancha rufa en las primarias. El Milano blanco (*Elanus leucurus*) es del mismo tamaño, pero blanco en las partes ventrales y plumizo en la parte dorsal, además se distingue por su cola blanca.

COMPORTAMIENTO:

Migrador neártico que puede ser observado en bandadas de más de 200 individuos, frecuentemente mezclados con otras especies de rapaces. Caza insectos en vuelo, en particular libélulas. Para desplazarse, incluso durante migración, utiliza térmicas para mantener su altitud sin la necesidad de batir sus alas.

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Ictinia plumbea

Milano plumizo – Sui sui – Plumbeous Kite

IDENTIFICACIÓN:

Rapaz delgada. Plumaje de color plumizo, más oscuro en la parte dorsal. Alas largas y finas con primarias negras con rufo. Cola ventral con dos barras blancas y estriado ventral plumizo

ESPECIES SIMILARES:

El Milano boreal (*Ictinia mississippiensis*) es muy parecida y comparte además un mismo comportamiento. La diferencia principal es la falta de la mancha rufa en las primarias. El Milano blanco (*Elanus leucurus*) es del mismo tamaño, pero blanco en las partes ventrales y plumiza en la parte dorsal, además se distingue por su cola blanca.

COMPORTAMIENTO:

Caza insectos en vuelo o desde una percha, en particular libélulas. Puede ser observado utilizando térmicas para mantener su altitud sin la necesidad de batir sus alas. Puede ser observado mezclado en bandadas del Milano boreal.

GRANDE

OCURENCIA **AN**

ESTADO **LC**



© Paulo Norberg

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Buteogallus coronatus

Águila coronada – Taguato hovy apirati – Chaco Eagle

IDENTIFICACIÓN:

Rapaz grande de color grisáceo, dorso más oscuro. Patas y cera de la cara de color amarillento. Notable copete nual. Cola negra con una faja blanca. Juvenil tiene el pecho manchado de pardo, la cabeza más ocrácea y gran ceja. Resto del parte ventral ocráceo estriado.

ESPECIES SIMILARES:

Difícil de confundir con otra especie por su gran tamaño. En vuelo, el Cuervo cabeza negro (*Cathartes aura*) y Cuervo de cabeza amarilla (*Cathartes burrovianus*) son más oscuros con las remeras ventrales cenicientas.

COMPORTAMIENTO:

Confiada. Puede acercarse bastante cuando está posado. Voz es un *Piídoo*.. agudo. Consume pequeñas presas de tamaño mediano, que han matado ellos mismos o que las ha encontrado muertas.

GRANDE

OCURENCIA **R**

ESTADO **EN EN**



© Frank Fragano

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Geranospiza caerulescens

Gavilán patas largas – Taguato hovy – Crane Hawk

IDENTIFICACIÓN:

Coloración general gris-celeste. Cola larga y angosta, negruzca barrada de canela y blanco. Vientre con fino barrado. Largas patas anaranjadas. En vuelo notable media luna blanca en base de primarias negras.

ESPECIES SIMILARES:

Se podría confundir la especie con el Milano pico garfio (*Chondrohierax uncinatus*) y el Aguilucho gris (*Buteo nitidus*), porque ambos tienen un plumaje gris con fino barrado ventral. El aguilucho gris es más chico, de patas cortas y amarillas, y posee un fino barrado en la parte dorsal. El Milano pico garfio tiene el pico mucho más ganchudo una cola menos larga.

COMPORTAMIENTO:

Confiado, caminador, salta entre ramas revisando epifitas y huecos. Realiza vuelos cortos mientras forrajea. Amplia dieta que consiste en roedores, lagartijas, ranas, murciélagos, aves, culebras, arañas, insectos, huevos y caracoles.

GRANDE

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Parabuteo unicinctus

Gavilán mixto – N/A – Bay-winged Hawk

IDENTIFICACIÓN:

Una rapaz de color negruzco, pero con cubiertas, tapadas y piernas de color rufo. Cola larga con la base, ápice y rabadilla blanca. Subcaudal ocráceo. Los juveniles tienen un plumaje de color ocre con estrías marrones y una marcada ceja ancha.

ESPECIES SIMILARES:

En vuelo, el Gavilán mixto se podría confundir con el Caracolero (*Rostrhamus sociabilis*) y también con el Aguilucho negro (*Buteo albonotatus*).

COMPORTAMIENTO:

Planea alto, utilizando térmicas para mantener su altitud. A menudo terrestre. Una de las rapaces más fácil de ver posada en árboles a lo largo de rutas en el Chaco seco.

GRANDE

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Jorge Martín Spinuzza

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Rupornis magnirostris**Tagatú común – Yndaje – Roadside Hawk****IDENTIFICACIÓN:**

Pecho barrado de canela con contrastante cabeza oscura. Dorsal pardo y la cola rufa con unas bandas oscuras. Llamativo parche rojizo en las primarias, obvio en vuelo. Inmaduros tienen frente, ancha ceja y garganta ocráceas, sin cabeza oscura. Dorso marginado de ocre, estriado ventral notable.

ESPECIES SIMILARES:

Los adultos son difícil de confundir con otras rapaces por su vuelo muy batido y los parches rojizos en las primarias. Los juveniles podrían ser confundidos con el Caracolero (*Rostrhamus sociabilis*) que también tiene plumaje con estrias verticales y una ceja notable.

COMPORTAMIENTO:

La voz es un fuerte y áspero *ieeeee...* Uno de las rapaces más comunes en el Paraguay. Común a los costados de rutas principales y secundarias, posado erecto y generalmente a media altura.

GRANDE**OCURRENCIA R****ESTADO LC**

© Jerry Cooper

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT

***Geranoaetus albicaudatus*****Aguilucho alas largas – Kurukuturi – White-tailed Hawk****IDENTIFICACIÓN:**

Pecho blanquecino, con capucha incompleta. Dorsal negruzco, hombros rufos. Cola blanquecina, con una faja terminal negra. En vuelo remeras barreadas y extremos negruzcos. Inmaduros con pecho pardo, manchado, cola blanquecina.

ESPECIES SIMILARES:

Se puede confundir con el Aguilucho langostero, una especie migratoria neártica que irregularmente visita al Paraguay, pero esta especie tiene la capucha completa y las alas más finas en vuelo.

COMPORTAMIENTO:

Planeador y generalmente solitario. Se posa en postes, ramas y lugares expuestos. Aunque puede ser observado también en el suelo.

GRANDE**OCURRENCIA R****ESTADO LC**

© Arne Lesterhuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Buteo albonotatus

Aguilucho negro – Taguato hû – Zone-tailed Hawk

IDENTIFICACIÓN:

Negruzco. Cola poco larga con tres fajas y ápice blancos. Ventral de remeras grisáceo, contrastando con tapadas y cuerpo negruzco. Cera y patas amarillas. Juveniles pardo negruzco, ventral punteado de blanco y cola con varias bandas.

ESPECIES SIMILARES:

En vuelo muy parecido al Cuervo cabeza negra (*Cathartes aura*), planeando idéntico con alas en "V" abierta, pero de menor tamaño y cola con barras negras y blancas. Además, puede ser confundido por el Gavilán mixto (*Parabuteo unicinctus*) o fases negras de varios otras rapaces como el Aguilucho de alas largas (*Buteogallus albicaudatus*), pero ambos carecen el ventral de remeras grisácea, contrastando con tapadas negras.

COMPORTAMIENTO:

Más probable de ver en vuelo que posado. Imita al Cuervo de cabeza roja en vuelo para poder sorprender a sus presas.

GRANDE

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Jorge La Grotteri

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Herpetotheres cachinnans

Guaicurú – Makagua – Laughing Falcon

IDENTIFICACIÓN:

Rapaz con cabeza grande que recuerda a una lechuza. En vuelo notable sus alas cortas y zona ocrácea en base de primarias. Notable antifaz negro. Dorsal pardo y ventral blanco. Cola negra y barrada. Juveniles tienen las alas marginadas de rufo.

ESPECIES SIMILARES:

Difícil de confundir con otras especies.

COMPORTAMIENTO:

Bastante confiado, posando alto en árboles secos. Voz llamativa, repetido grito como risa *gua..cú..* y otras voces a menudo a dúo. Su pose es bien erecta.

GRANDE

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo Cabral

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Spizapteryx circumcincta

Halconcito gris – Taguato'i – Spot-winged Falconet

IDENTIFICACIÓN:

Alas romas (no agudas como otros halcones) con pecas blancas y cola negra de barrado blanco. Pequeño pero robusto. Dorso gris pardusco y estriado. Larga ceja blanca y también malar, garganta, abdomen y rabadilla blanca. Ventral con fino, pero neto estriado.

ESPECIES SIMILARES:

Difícil de confundir con otras especies. Otros halcones tienen alas más agudas y son más delgados al posarse (no robusto).

COMPORTAMIENTO:

Confiado y frecuentemente posado en sitios visibles. Su vuelo es recto con aleteo veloz, recuerda al vuelo de una cotorra. Utiliza nidos de cotorra u otros nidos viejos hechos de palitos. Cloqueo nasal mientras balancea la cola.

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ENDÉMICO

ESTADO **LC**



© Andy Holman

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Falco sparverius

Halconcito colorado – Kiri kiri'i – American Kestrel

IDENTIFICACIÓN:

Pequeño halcón con corona plumiza. Dorso y cola dorsal rufos. Bigote, patilla y mancha nugal, negros. Cubiertas plumizas con pecas negras. Ventral moteado. La hembra con todo el dorsal rufo de barrado negro y ventral estriado de pardo.

ESPECIES SIMILARES:

Difícil de confundir con otras especies. Otros halcones tienen el dorso oscuro, plumizo o negro, en vez de rufo.

COMPORTAMIENTO:

Posado en sitios visibles como postes y cables. Bastante confiable. Vuela rápido y a menudo permanece "halconeando" en un mismo sitio. La voz es un grito rápido *tli...tli...tli...tli*.

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hemme Batjes

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Falco femoralis

Halcón plumizo – Kiri kiri guasu – Aplomado Falcon

IDENTIFICACIÓN:

Dorso plumizo. Las alas plegadas llegan a la mitad de la cola larga, negro barrado de blanco. Vincha ocrácea blancuzca, bigote y faja auricular negros. Garganta y mejillas blancuzcas. Pecho algo estriado con "chaleco" negruzco.

ESPECIES SIMILARES:

Bastante parecido al Halcón peregrino (*Falco peregrinus*) pero tiene la cola más larga y más delgada. Además, el Halcón peregrino carece del "chaleco" negruzco.

COMPORTAMIENTO:

Posado en sitios visibles. Se encuentra en pareja o solitario. Aprovecha los incendios para atrapar presas que escapan. Se ha observado que suele cazar en pareja.

GRANDE

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Nicolás Cantero

© Paul Smith

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Cariama cristata

Sarí patas rojas – Sarí pytá – Red-legged Seriema

IDENTIFICACIÓN:

Ave grande con pico y largas patas rojas. Largo y despeinado penacho frontal. Plumaje de color gris pardusco, poco más oscuro en la parte dorsal.

ESPECIES SIMILARES:

Confundible con la Sarí patas negras (*Chunga burmeisteri*), pero como dice su nombre, esta tiene largas patas negras (en vez de rojo) y pico negro también. Canto muy similar.

COMPORTAMIENTO:

Poco gregaria. Terrestre, principalmente caminadora y corredora. Sin embargo, nidifica en árboles. Raramente vuelan.

GRANDE

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Arne Lesterhuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Chunga burmeisteri**Saría patas negras – Saría hû – Black-legged Seriema****IDENTIFICACIÓN:**

Ave grande con pico y largas patas negras. Plumaje en general grisáceo, marcada ceja blanca. Cola larga.

ESPECIES SIMILARES:

Confundible con la Saría patas rojas (*Cariama cristata*), pero como dice su nombre, esta tiene largas patas rojas (no negras) y también un pico rojo. Su canto es muy similar.

COMPORTAMIENTO:

A menudo se ve en pareja o pequeños grupos. Terrestre, principalmente caminadora y corredora. Raramente vuelan.

GRANDE**OCURENCIA R****ENDÉMICO****ESTADO LC**

© Guyra Paraguay

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT

***Columbina squammata*****Palomita escamada – Pyku'i pini – Scaled Dove****IDENTIFICACIÓN:**

Palomita pequeña con parte dorsal de color gris claro y el parte ventral blanquecino. Todo el plumaje escamado de negro. Larga cola negra con timoneras externas blancas. Faja alar blanca y una zona rufa en remeras, visibles en vuelo.

ESPECIES SIMILARES:

La Tortolita picuí (*Columbina picui*) es más o menos del mismo tamaño con el plumaje de color grisáceo y tiene timoneras externas blancas, sin embargo, tiene la cola más corta y generalmente apuntada hacia abajo. Además, carece el contrastante escamado de la Palomita escamada.

COMPORTAMIENTO:

Es una especie semiterrestre que se puede ver en pareja o pequeños grupos. Se alimenta en el suelo y suele salir a espacios abiertos. Llamativa cola larga apuntada hacia arriba cuando esta en el suelo. Su voz es un continuo y aflautado *kuu..kahou..*

PEQUEÑA**OCURENCIA R****ESTADO LC**

© Jorge La Grotteri

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



HÁBITAT



Columbina picui

Tortolita picuí – Pyku'i – Picui Ground-Dove

IDENTIFICACIÓN:

Pequeña paloma de color gris dominante. Cabeza y cuello cenicientos, ventral más blancuzco. Las cubiertas con una línea negra. Faja alar longitudinal blanca, contrastada con remaras negras. La hembra tiene una apariencia más pardusca que el macho.

ESPECIES SIMILARES:

Se podría confundir con la Palomita escamada (*Columbina squammata*) que también tiene un plumaje grisáceo, pero estira más a blancuzca y además esta cubierta de escamas negras. Además la Palomita escamada tiene una cola notablemente más larga.

COMPORTAMIENTO:

Muy común y fácil de ver. Se la puede observar en pareja o en grupos, alimentándose en el suelo. Camina rápida moviendo la cabeza hacia atrás y hacia adelante. La voz es un repetido *kuú...*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Patagioenas picazuro

Paloma turca – Pykasuro – Picazuro Pigeon

IDENTIFICACIÓN:

Paloma grande de color plumizo, cabeza y el pecho vinosos. Iris rojizo. Filetes celestes apretados y brillantes en cuello dorsal. Medialuna blanca en cubiertas, claramente visible en vuelo

ESPECIES SIMILARES:

La Paloma manchada (*Patagioenas maculosa*) carece el color vinoso en la cabeza y el pecho, y no tiene los filetes celestes en el cuello. Además, la Paloma manchada tiene manchas blancas en las alas en vez de una medialuna como la Paloma turca.

COMPORTAMIENTO:

Solitario, en parejas o formando bandadas. Se alimenta frecuentemente en el suelo, incluso sobre rutas. Es una especie arisca con un vuelo rápido y potente. Su voz es un fuerte *kuúu...ku...ku...kuúu...*

MEDIANA

OCURRENCIA **AS**

ESTADO **LC**



© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Zenaida auriculata

Torcaza – Mbairari – Eared Dove

IDENTIFICACIÓN:

Paloma mediana con partes dorsales pardos oliváceos y un brillo dorado en el cuello lateral. Cabeza y partes ventrales ocre vinácea, más blanco en el abdomen. Llamativa son las manchas negras en las alas y la cara. Cola plumiza con faja subapical negra y ápice externo blanco.

ESPECIES SIMILARES:

La Tortolita colorada (*Columbina talpacoti*) también tiene manchas negras en las alas, pero es más pequeña y más rufa. La Palomita azulada (*Claravis pretiosa*), también tiene manchas negras en el ala, pero el macho es más azulado y la hembra es más oscura, con una cola rufa.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente en bandadas, que pueden llegar a miles en áreas con cultivos como sorgo, soja y maíz. Es una especie terrestre, que se alimenta principalmente semillas.

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Tatiana Galluppi

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Leptotila verreauxi

Jeruti común – Jeruti – White-tipped Dove

IDENTIFICACIÓN:

Dorsal pardo. Cabeza, cuello y pecho gris claro con tinte vináceo y reflejos verdosos en la parte posterior. Amplia frente rosácea. Ala ventral rufa, más notable en vuelo. Cola oscura con puntas blancas. Piel desnuda alrededor del ojo de color celeste y pata rojas.

ESPECIES SIMILARES:

A distancia puede ser confundido por la Torcaza (*Zenaida auriculata*), pero el Jeruti común es más grande y carece las manchas negras en la cabeza y en las alas.

COMPORTAMIENTO:

Muy terrestre y generalmente solo o en pareja. Prefiere áreas con vegetación densa cercana, pero sale a áreas abiertas para alimentarse. El canto es un melancólico *Búuuuh....búuuuuuuuh*, dos tonos suaves y profundos que repite frecuentemente.

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Frank Fragano

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Thectocercus acuticaudatus

Maracaná cabeza azulada – Ñendai – Blue-crowned Parakeet

IDENTIFICACIÓN:

Casi todo verde, pero con cabeza azulada. Pico claro córneo con mandíbula oscura. Piel alrededor del ojo blanquecina. Cola larga con base rojiza en la parte ventral, visible en vuelo. Alas amarillo verdoso por debajo.

ESPECIES SIMILARES:

En vuelo se puede confundir con el Maracaná ala roja (*Psittacara leucophthalma*) y el Ñanday (*Aratinga nenday*), ambos del mismo tamaño. El Ñanday tiene la cabeza negra, pico negro y la cola y las alas negruzco debajo. El Maracaná ala roja tiene manchas rojas y amarillas debajo del ala y todo el pico claro.

COMPORTAMIENTO:

Muy ruidoso y anda en parejas o en grupos, a veces muy numerosas. Generalmente se posa alto en la copa de los árboles. Se alimenta principalmente de frutos, granos, semillas y flores.

MEDIANO

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Arne Lesthuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Aratinga nenday

Ñanday – Ñandái – Nanday Parakeet

IDENTIFICACIÓN:

Casi todo verde, pero con pico y capuchón negro. Pecho teñido de celeste. Piernas rojas. Piel alrededor del ojo negruzca. Cola y las alas negruzcas debajo.

ESPECIES SIMILARES:

En vuelo se puede confundir con el Maracaná ala roja (*Psittacara leucophthalma*) y el Maracaná cabeza azulada (*Thectocercus acuticaudatus*), ambos del mismo tamaño. El Maracaná cabeza azulada tiene el cabeza azulada, Pico claro córneo con mandíbula oscura y la cola larga con base rojiza en la parte ventral. El Maracaná ala roja tiene manchas rojas y amarillas debajo del ala y todo el pico claro.


COMPORTAMIENTO:

Voz un fuere y aguda yrrie... yrrie... yrrie... Muy ruidoso y anda en parejas o en grupos, a veces muy numerosas. A menudo se puede ver bandadas alimentándose en el suelo, pero también en árboles.

MEDIANO

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Frank Fragano

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Pionus maximiliani**Loro choclero – Maitaka – Scaly-headed Parrot****IDENTIFICACIÓN:**

Plumaje verde opaco algo escamado. Corona negruzca. Anillo ocular blanco y pico córneo y negruzco. Parte de la garganta y pecho violáceo. Cola corta y subcaudal rojo.

ESPECIES SIMILARES:

En vuelo y posado recuerda a un Loro hablador (*Amazona aestiva*) pero es un poco más pequeño, con cola más corta y un color verde más oscuro. Además, el Loro hablador tiene la cara amarilla y tiene rojo en el ala, notable en vuelo.

COMPORTAMIENTO:

Vuelo llamativo; aleteando de la horizontal hacia abajo, casi juntando las alas. Solo o en pareja, a veces pequeñas bandadas.

MEDIANO**OCURRENCIA R****ESTADO LC**

© Arne Lesthuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT

***Amazona aestiva*****Loro hablador – Parakáu – Turquoise-fronted Amazon****IDENTIFICACIÓN:**

Plumaje verde dominante con amplia frente celeste y cara, garganta y hombros amarillos. Pico y patas negruzcas. Además de hombros amarillos, también posee rojo y amarillo en las alas. Más visible en vuelo.

ESPECIES SIMILARES:

Se podría confundir con el Loro choclero (*Pionus maximiliani*) pero esta es más pequeña y de un color verde más oscuro. Además, es notable la cara amarilla y el ala roja y azul del Loro hablador.

COMPORTAMIENTO:

En pareja o en pequeñas bandadas. Generalmente posa en las copas de árboles, gritando con su voz *kkrrreo...* Mientras se alimenta, no emite sonido y se mimetiza perfectamente con las hojas del árbol. Muy afectada por el tráfico ilegal de mascotas.

GRANDE**OCURRENCIA R****ESTADO LC**

© Tatiana Galluppi

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Coccyzus melacoryphus

Cuclillo canela – Tuja puka – Dark-billed Cuckoo

IDENTIFICACIÓN:

Corona cenicienta, contrastada con antifaz negro y periocular amarillento. Áreas dorsales pardo oliváceas, mientras el plumaje ventral es de color crema ocráceo/canela. Cola larga y graduada, negro por debajo y con las puntas blancas. Pico negro y levemente curvado.

ESPECIES SIMILARES:

Muy parecido a varias especies de *Coccyzus*. Sin embargo, solo el Cuclillo canela tiene el plumaje ventral de color crema ocráceo/canela. El Cuclillo alas rojizos (*Coccyzus americanus*), es blanco por debajo.

COMPORTAMIENTO:

Solitario o en pareja. Se mueve con agilidad y velocidad entre las ramas, es bastante inquieto. Vuela generalmente a bajas alturas, cruzando rápido áreas abiertas.

MEDIANO

OCURRENCIA **AN**

ESTADO **LC**



© Arne Lestehuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Coccyzus americanus

Cuclillo alas rojizos – Toutou – Yellow-billed Cuckoo

IDENTIFICACIÓN:

Dorsalmente pardo oliváceo, ventral blanco. Pico levemente curvado con mandíbula amarilla. Cola oscura con las puntas y bordes externos de color blanco. Rufo en las primarias, muy notable en vuelo.

ESPECIES SIMILARES:

Muy parecido a varias especies de *Coccyzus* sp. Lo más importante de tener en cuenta es que el Cuclillo alas rojizos tiene rufo en las alas, que las otras especies no tienen.

COMPORTAMIENTO:

Migrado neotropical. Solitario o gregario. Nidifica en los Estados Unidos y Canadá, solo ocurre en Paraguay entre septiembre y marzo aproximadamente. Vuela generalmente a alturas bajas, cruzando rápido áreas abiertas y rutas. Se mueve con agilidad y velocidad entre las ramas, es bastante inquieto.

MEDIANO

OCURRENCIA **N**

ESTADO **LC**



© Sergio Ríos



© Paul Smith

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Megascops choliba

Lechucita común – Kavure – Tropical Screech-Owl

IDENTIFICACIÓN:

Dorso y nuca gris pardusco (o castaño), estriado de negro. Ventralmente blanquecino con finas estrías negras, como pequeñas crucecitas. Pequeñas orejas eréctiles. Ojos amarillos.

ESPECIES SIMILARES:

Difícil de confundir con otras especies. Único de su tamaño en el Chaco seco de Paraguay, el Caburé (*Glaucidium brasilianum*) es algo similar, pero es más pequeño, como la mitad del tamaño y carece orejitas.


COMPORTAMIENTO:

Aflautado e inconfundible *krrrr... cú..cú..* que se escucha durante la madrugada. Solitario o en pareja. Caza durante la noche y duerme escondido en la vegetación durante el día, bien camuflado.

MEDIANO

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Clyde Morris

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Bubo virginianus

Ñacurutú – Ñacurutu – Great Horned Owl

IDENTIFICACIÓN:

La mayor lechuza en el Paraguay. Notables orejas triangulares, distanciadas y negruzcas. Garganta y collar blanco. Ventral blancuzco con fino barrado de negro. Cola barrada parda. Disco facial bordeado de blanco y negruzco.

ESPECIES SIMILARES:

No hay otras lechuzas del tamaño del Ñacurutú. El Lechuzon orejudo (*Asio clamator*) es más blanco, con estrías verticales y las orejas más largas y juntas.


COMPORTAMIENTO:

Solitario o en pareja. Nocturno. De día se posa en los árboles y arbustos pero también lugares expuestos como postes de electricidad. Se puede identificar sus dormideros por la presencia de abundantes egagrópilas.

GRANDE

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo Cabral

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Strix chacoensis

Lechuza chequeña – Suida chaco – Chaco Owl

IDENTIFICACIÓN:

Lechuza con disco facial blan-
cuzco, con concéntricas oscu-
ras. Notable barrado ventral
pardo oscuro. Alas y cola ba-
rradas de canela. Pico y piernas
amarillentas

ESPECIES SIMILARES:

Difícil de confundir con otra Le-
chuza en el Chaco seco. No ha
otras especies de su tamaño, sin
orejas y todo barrado.

COMPORTAMIENTO:


Normalmente en pareja, pero
a veces solitario. Nocturno.
Comienza a moverse en el cre-
púsculo, marcando su territorio
con su fuerte gruñido *Kru...kru...
kru...krau...krau..*. Frecuentemen-
te posado en postes, bastante
confiado.

GRANDE

OCURRENCIA **R**

ENDÉMICO

ESTADO **LC**



© Arne Lestehuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Glaucidium brasilianum

Caburé – Kavure'i – Ferruginous Pygmy-Owl

IDENTIFICACIÓN:

Pequeño y sin orejas. Tiene una
cara simulada en su nuca, bien
llamativa. Gris pardusco. Ceja
blanca. Barba y garganta blan-
ca separadas por collar pardo.
Grueso estriado ventral castaño.
Cola parda con pocas barras
blancas. Hay una fase más rufa,
pero no es común en el Chaco
seco.

ESPECIES SIMILARES:

Inconfundible. Más pequeño
que la Lechucita común (*Megas-
cops choliba*) que además tiene
orejitas.


COMPORTAMIENTO:

Bastante diurno en sitio visibles,
solitario o en pareja. Canto una
larga serie de cloqueos *u...u...u...*
Parecidos al canto del Surucú
(*Trogon* sp.) y también imitada
por el Tingazú (*Piaya cayana*).
Frecuentemente otras aves lo
acosan al encontrarlo. Menea y
balancea la cola.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo Cabral

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Chordeiles minor

Añapero boreal – Yvyja'u mi – Common Nighthawk

IDENTIFICACIÓN:

Silueta de halcón en vuelo. Alas largas y puntiagudas, pardo-negruzcas. Triangulo blanco en la garganta (más ocráceo en hembras). Mancha alar blanca en primarias negras. Cola furcada con faja blanca (ausente en hembra). Ventral finamente barrado oscuro.

ESPECIES SIMILARES:

El Ñacundá (*Chordeiles nacunda*), Curiango (*Nyctidromus albicollis*), Atajacaminos chico (*Setopagis parvula*) y el Atajacaminos Ñañarca (*Caprimulgus longirostris*) tienen una mancha alar blanca, pero todos con colas redondeadas (no furcado).

COMPORTAMIENTO:

Nocturno. Durante el día posa en ramas de árboles altos. Produce un agudo *piit...* Se alimenta de insectos que caza en vuelo, a veces formando bandadas.

MEDIANO

OCURENCIA **N**

ESTADO **LC**



© Paul Smith

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Nyctidromus albicollis

Curiango – Luirivevu – Pauraque

IDENTIFICACIÓN:

Pardo oscuro con manchas negras y canela. Cola larga y redondeada con timoneras externas negras y blancas. Filete dorsal negro. Mejillas rufas. Triangulo blanco en la garganta. Banda blanca en primarias negras. Hembra con mancha más ocrácea en primarias. Cola y garganta menos blancas.

ESPECIES SIMILARES:

El Ñacundá (*Chordeiles nacunda*) más grande y con parte ventral blanca. El Atajacaminos chico (*Setopagis parvula*) es más chico y con muy poco blanco en la cola. El Atajacaminos Ñañarca (*Caprimulgus longirostris*) se asemeja mucho, pero tiene menos blanco en la cola y carece de rufo en las mejillas.

COMPORTAMIENTO:

Nocturno y muy terrestre. A menudo posado en la ruta, realizando cortos vuelos para alimentar. Durante el día está posado en el suelo, escondido entre la vegetación.

MEDIANO

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Arne Lestherhuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Setopagis parvula

Atajacaminos chico – Kuchu'i guy guy – Little Nightjar

IDENTIFICACIÓN:

Dorsalmente pardo con manchas canelas y marrones. Faja nugal canela continua en triángulo blanco en la garganta. Solo leve ápice caudal blanco. Punteado de blanco en cubiertas. Hembra sin alar blanco. Primarias y cola barradas de canela.

ESPECIES SIMILARES:

Más chica que las otras especies con mancha alar blanca, como el Ñacunda (*Chordeiles nacunda*), Curiango (*Nyctidromus albicollis*), Atajacaminos nañarca (*Caprimulgus longirostris*). Bastante similar al Añapero boreal (*Chordeiles minor*) pero el Atajacaminos chico tiene la cola redondeada (no furcada).

COMPORTAMIENTO:

Suele sentarse en ramas bajas o en el suelo, oculto. Al ser molestado realiza un vuelo corto para ocultarse en otro lugar. Nocturno. Voz llamativa *pcchrrui...cui-cuicucui...*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **AN**

ESTADO **LC**



© Paul Smith

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Chaetura meridionalis

Vencejo de tormenta – Mbyju'i mbopi – Sick's Swift

IDENTIFICACIÓN:

Todo pardo oscuro (negruzco), pero la parte dorsal más oscura que la parte ventral. Alas finas y puntiagudas. Cola y rabadi-lla contrastante de color gris más claro. Garganta pálida. Cola bastante corta con espinas, solo visible de cerca.

ESPECIES SIMILARES:

Vencejos son difícil de distinguir, en particular las *Chaeturas* sp. Sin embargo, el Vencejo de tormenta es la única que podría ocurrir en el Chaco seco paraguay.

COMPORTAMIENTO:

Gregario. Bandadas a veces muy numerosas, volando a bajas alturas cazando insectos. Voz un repetitivo *tip...tip...tip*.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **AN**

ESTADO **LC**



© Nicolás Cantero

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Heliomaster furcifer

Picaflor de barbijo – Mainumby jetapa – Blue-tufted Starthroat



IDENTIFICACIÓN:

Cola furcada, largo pico y levemente curvado. Macho con garganta rojo rubí y corona celeste. Penachos gulares y ventral azul violáceo. Manchita postocular blanca. Verde dorsalmente. Hembra coloración modesta: blanca ventral y verde dorsal. Ápice caudal externa blanco.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Sergio Ríos

© Tatiana Galluppi

ESPECIES SIMILARES:

Puede confundir con el Picaflor verde (*Chlorostilbon lucidus*) pero este no tiene el pico tan largo y es más chico. El Picaflor de vientre negro (*Anthracothorax nigricollis*) es del mismo tamaño con pico negro curvado, pero ventral negra y cola de color granate y redondeada. La hembra tiene ventral blanco, pero con faja vertical negra.

COMPORTAMIENTO:

Se mueve rápido entre árboles y arbustos en todos los niveles de altura. Generalmente emite una voz de contacto como un agudo, fino y corto silbido. Después de la reproducción el macho cambia su plumaje a un plumaje similar a la hembra.

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Chlorostilbon lucidus

Picaflor verde – Mainumby hovyú – Glittering-bellied Emerald

IDENTIFICACIÓN:

Verde brillante con cola azul. Garganta y pecho azul verdoso. Pico rojo con la punta negra. La hembra de color más modesto. Línea postocular y ápice caudal blancuzcos. Ventral grisáceo.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Nicolás Cantero

© Matt Denton

ESPECIES SIMILARES:

Se podría confundir con el Picaflor bronceado (*Hylocharis chrysura*), pero su plumaje es completamente verde con un brillo dorado y la cola bronceada (no azul).

COMPORTAMIENTO:

Uno de los colibríes más comunes. Incansable *tzrr.....tzrr..* mientras que forrajea. Es bastante territorial y persigue individuos de su misma especie u otras especies (incluso especie más grandes como el Picaflor de barbijo (*Heliomaster furcifer*)).

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Hylocharis chrysura

Picaflor bronceado – Kuarahy avá – Gilded Sapphire

IDENTIFICACIÓN:

Todo verde con un brillo dorado. Barbilla algo canela y cola bronceada. Pico rojo con la punta negra. La hembra es similar, sin embargo su verde es más apagado y el abdomen más grisáceo.

ESPECIES SIMILARES:

Parece mucho al Picaflor verde (*Chlorostilbon lucidus*), especialmente se podría confundir con la hembra por el vientre más grisáceo. Sin embargo, el Picaflor bronceado no tiene una línea postocular, ni ápice caudal blancuzcos

COMPORTAMIENTO:

Mientras que esta posado o forrajeando, emita fuertes y agudos y rápidos *ii...ii...ii...ii..*. Se alimenta en distintos niveles en árboles y arbustos. Muy territorial, especialmente en árboles o arbustos con muchas flores.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Paul Smith

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Momotus momota

Burgo – Guyra paja – Amazonian Motmot

IDENTIFICACIÓN:

Vientre y abdomen ocre verdoso. Corona negra y antifaz negro rodeado de celeste. Gotas negras pectorales. Llamativa cola larga terminada en dos timoneras, con raquis parcialmente desnudo, como palmetas.

ESPECIES SIMILARES:

Inconfundible con cualquier especie del Chaco seco.

COMPORTAMIENTO:

Semiterrestre. Solitario o en pareja. Relativamente fácil de ver en Cerro León. Llamativo canto gutural *Brrr...brrr...* o un profundo *Hú...dudú...* al atardecer y al amanecer. Anida en cuevas de barrancas.

GRANDE

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo Cabral

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Nystalus maculatus**Durmili – Chakuru para – Spot-backed Puffbird****IDENTIFICACIÓN:**

Dorsal pardo ondeado de ocre. Collar completo ocre anaranjado. Cola barrada de ocre y negro. Ventral blanco con estrías negras. Ceja clara e iris amarillo.

ESPECIES SIMILARES:

Inconfundible.

COMPORTAMIENTO:

Se expone, pero quieto. Generalmente en pareja, a veces grupos familiares. Voz un melancólico y descendente *pri..pri..prii..*. Realiza rápidos vuelos para capturar sus presas del suelo. Nidifica en cuevas propias en barrancas.

PEQUEÑO**OCURRENCIA R****ESTADO LC**

© Diego Bueno

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT

***Picumnus cirratus*****Carpinterito común – Ypekú ne'i – White-barred Piculet****IDENTIFICACIÓN:**

Ventral barrado blanco y negro. Dorsalmente pardo grisáceo. Corona negra con pintas rojas y blancas. Cara blanquecina, finalmente barrado negruzco.

ESPECIES SIMILARES:

No hay otro carpinterito de este tamaño en el área. Hay especies similares en el Bosque Atlántico del Paraguay pero no ocurren al Chaco seco.

COMPORTAMIENTO:

Canta un descendente *uirrrr...* Forrajea en la parte media y baja de los árboles y arbustos. Picotea muy enérgicamente, muy audible, abriendo agujeros en busca de insectos y larvas. Nidifica en troncos, la entrada al nido siendo aproximadamente de 2 cm.

PEQUEÑO**OCURRENCIA R****ESTADO LC**

© Paul Smith

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Melanerpes cactorum

Carpintero del cactus – Tiri tiri – White-fronted Woodpecker

IDENTIFICACIÓN:

Carpintero con amplia frente y nuca blanca, pero con rojo en la corona. Alas, flancos, rabadi-lla y cola barradas. Garganta amarilla. Dorso negro y pecho gris ocráceo, más blanquecino hacia partes ventrales, flancos levemente barrados. Hembra sin corona roja.

ESPECIES SIMILARES:

Inconfundible. Es del mismo tamaño del Carpintero bataraz (*Veniliornis mixtus*), sin embargo, ésta es completamente barrada y sin amarillo.


COMPORTAMIENTO:

Generalmente en pareja, a veces en grupos. Trepa y posa en lugares expuestos, incluso a menudo en cactus, donde también nidifica. Caza en el aire. La voz es un áspero y algo nasal "chik-guet chit-guet".

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Jonathan Newman

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Veniliornis mixtus

Carpintero bataraz – Ypekû mbatara – Checkered Woodpecker

IDENTIFICACIÓN:

Dorso y alas maculados, ventral todo estriado. Corona estriada, con rojo solo en la nuca. Ceja y malar blancuzco. Hembra similar, pero sin rojo en la nuca.

ESPECIES SIMILARES:

Inconfundible por su plumaje barrado y maculado completo. El Carpintero del cactus (*Melanerpes cactorum*) es del mismo tamaño, pero tiene la garganta amarilla y sin barrado en la mayor parte ventral.


COMPORTAMIENTO:

Confiado. Trepa ramas de árboles y arbustos, casi nunca troncos. . Emita una voz aguda "Chiriririririri...".

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Diego Bueno

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Dryocopus schulzi

Carpintero negro – Ypekû hû – Black-bodied Woodpecker

IDENTIFICACIÓN:

Pico córneo. Cara y garganta grisáceas. Ventral completamente negro, sin barrado. Líneas blancas en cuello y espalda. Cabeza con cresta y malar rojo, hembra solo con cresta roja, pero frente y malar negro.

ESPECIES SIMILARES:

Fácilmente confundido con el Carpintero garganta estriada (*Dryocopus lineatus*), pero este tiene ventral blancuzco barrado de negro. El Carpintero lomo blanco (*Campephilus leucopogon*) es algo parecido por tener su ventral negro uniforme, pero se diferencia por su triángulo dorsal crema bien obvio.

COMPORTAMIENTO:


Solitario o en pareja. Canto con un nasal y fuerte *uit...uit...uit...*. Cada vez más difícil de ver en el Chaco paraguayo, posiblemente debido a la pérdida de hábitat.

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ENDÉMICO

ESTADO **LC**



© Jerry Cooper

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Campephilus leucopogon

Carpintero lomo blanco – Ypekû akâ pytâ – Cream-backed Woodpecker

IDENTIFICACIÓN:

Capuchón todo rojo, hembra con frente y corona parcialmente negra. Ventral negro uniforme. Triángulo dorsal crema. Tapadas canelas.

ESPECIES SIMILARES:

El Carpintero negro (*Dryocopus schulzi*) es también negro uniforme en la parte ventral, sin embargo, carece de triángulo dorsal crema, y tiene una línea blanca en el cuello, que a veces continúa en la espalda.

COMPORTAMIENTO:

Solitario o en pareja. Voz un fuerte *ptsiu...*. Trepas en lugares expuesto, bastante confiado. Más común que el Carpintero negro.

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ENDÉMICO

ESTADO **LC**



© Nicolás Cantero

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Furnarius cristatus

Hornerito copetón – Ogaraity chaco – Crested Hornero

IDENTIFICACIÓN:

Dorso de color castaño. Garganta blancuzca, resto del ventral acanelado. Cola rufa. Notable copete.

ESPECIES SIMILARES:

Muy parecido al Hornero (*Furnarius rufus*), pero un poco más pequeño. Además, el Hornero no tiene copete.

COMPORTAMIENTO:

Muy terrestre. Menos manso que el Hornero. Recorre el suelo en busca de alimento. Hace un nido de barro, pero con entrada más pequeña que el Hornero y siempre en árboles.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ENDÉMICO

ESTADO **LC**



© Arne Lestherhuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Synallaxis frontalis

Pijuí frente gris – Che tu'i – Sooty-fronted Spinetail

IDENTIFICACIÓN:

Frente gris y corona rufa. Garganta negruzca, no siempre visible. Timoneras y alas, especialmente las cubiertas, marginadas de rufo. Sin ceja notable. Ventral grisáceo. Cola rufa.

ESPECIES SIMILARES:

Muy parecido al Pijuí cola parda (*Synallaxis albescens*), pero esta, como dice su nombre, tiene la cola más parda y tiene menos rufo en las alas. El canto es también distinto.

COMPORTAMIENTO:

Más fácil de identificar por su canto, un agudo y repetido *pi... jui...*. Generalmente anda en pareja. Común pero difícil de ver, pues no suele alejarse de la vegetación densa.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Synallaxis albenscens**Pijuí cola parda – Chikli – Pale-breasted Spinetail****IDENTIFICACIÓN:**

Áreas dorsales pardo claro con corona y cubiertas alares rufas. Ceja blancuzca y mancha gular difusa. Ventral más blancuzco.

ESPECIES SIMILARES:

Muy parecido al Pijuí frente gris (*Synallaxis frontalis*), pero este tiene la cola de color rufo y tiene más rufo en las alas. El canto es distinto también.

COMPORTAMIENTO:

Se comporta de forma similar al Pijuí frente gris, pero es más observado en arbustos en áreas abiertas. Canto un aspero *prrrr... jui*. Muy movedizo e inquieto, más fácil oír que ver.

PEQUEÑO**OCURENCIA NM****ESTADO LC**

© Francesco Veronesi

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT

***Synallaxis albilora*****Pijuí espinosa – Guyra Karaguataty – White-lore Spinetail****IDENTIFICACIÓN:**

Dorso rufo acanelado, alas y cola rufas. Cabeza más gris y con un loreal blanco. Garganta blanca y resto del vientre ocráceo acanelado.

ESPECIES SIMILARES:

Su cuerpo rufo acanelado con contrastante cabeza grisácea lo hace bastante inconfundible.

COMPORTAMIENTO:

Solitario o en pareja. Canto un triste *jiiu..juut ...juuiit...* Forrajea en el sotobosque y en matorrales, bastante terrestre.

PEQUEÑO**OCURENCIA R****ESTADO LC**

© Frank Fragano

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Asthenes baeri

Canastero chaqueño – Havía kapi'i kua chaco – Short-billed Canastero

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**

IDENTIFICACIÓN:

Dorso gris pardusco, ventral blanco ocráceo, más canela en los flancos. Mancha en la garganta castaña. Cola erecta con timoneras centrales negras y externas rufa, bien notable en vuelo.

ESPECIES SIMILARES:

Muy parecido al Canastero coludo (*Asthenes pyrrholeuca*) que es un migrador austral y sólo ocurre en Paraguay durante el invierno. Cola más larga que el Canastero chaqueño y no erecta. Mancha en la garganta más anaranjada.

COMPORTAMIENTO:

Confiado. Terrícola, entre los arbustos, pero siempre bajo. Difícil de ver ya que se oculta rápido. Su canto un trino largo y monótono.



© Paul Smith

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Phacellodomus rufifrons

Espinero frente rojiza – Añumby'i – Rufous-fronted Thornbird

IDENTIFICACIÓN:

Dorso, alas y cola pardos. Amplia frente rufa y notable ceja blancuzca. Ventral todo gris blancuzco.

ESPECIES SIMILARES:

Muy parece al Espinero chico (*Phacellodomus sibilatrix*), pero más grande, suele elevar la cola y tiene más rufo en los hombros y timoneras externas (y poco en la frente).

COMPORTAMIENTO:

Forrajea en los árboles y en los arbustos saltando de rama en rama con la cola algo elevada. Generalmente anda en pareja, a veces en pequeños grupos familiares. Muy territorial.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Arne Lestherhuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Phacellodomus sibilatrix**Espinero chico – Añumby'i – Little Thornbird****IDENTIFICACIÓN:**

Dorso pardo, con poco rufo en la frente. Leve color rufo en los hombros y timoneras externas. Vientre blanco acanelado.

ESPECIES SIMILARES:

Muy parecido al Espinero frente rojiza (*Phacelodorus rufifrons*), pero sin las prominentes cejas blancas y el abundante rufo en la frente. También bastante similar al Canastero chaqueño (*Asthenes baeri*), pero más chico y no tiene la mancha gular castaña.

COMPORTAMIENTO:

Muy inquieto y recorredor en grupos pequeños. En árboles y arbustos, a alturas baja a media. No suele elevar la cola. Su canto es un largo y fuerte *twi..twi..twi..* recuerda algo al Hornero.

PEQUEÑO**OCURRENCIA R****ESTADO LC**

© Oscar Bordón

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT

***Coryphistera alaudina*****Crestudo – Guiriri – Lark-like Brushrunner****IDENTIFICACIÓN:**

Notable y fino copete, erecto negruzco. Dorsal estriado de color negro y ventral de color canela. Cara blanca con mancha canela. Cola con rufo en la base de rectrices externas. Patas anaranjadas.

ESPECIES SIMILARES:

De lejos puede parecer a un Hornero pero estriado y corredor.

COMPORTAMIENTO:

Bastante terrestre, ruidoso, confiado. Visto en grupos chicos. Trino agudo.

PEQUEÑO**OCURRENCIA R****ESTADO LC**

© Nicolás Cantero

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Pseudoseisura lophotes

Cacholote castaño – Sorototo – Brown Cacholote

IDENTIFICACIÓN:

Pico robusto, mandíbula e iris color marfil. Notable copete oscuro. Dorso castaño, rabadilla y cola rufas.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Bastante terrestre, buscando alimento en el suelo. Bullanguero, confiado. Canto a dúo y chirriante. De vuelo lento y ondulado, acrobático. Sus nidos son enormes y hechos de palitos.

MEDIANO

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Arne Lesterrhuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Tarphonomus certhioides

Bandurrita chaqueña – Chaco Earthcreeper

IDENTIFICACIÓN:

Alas y cola castañas. Pico algo largo (2,5 cm), algo curvado. Notable garganta blanca contrastada con el resto del vientre castaño claro. Ceja un poco más clara.

ESPECIES SIMILARES:

Parece un Hornero pero es más marrón en parte dorsal y su pico más largo.

COMPORTAMIENTO:

Más oída que vista, oculta en le vegetación baja. Siempre en movimiento, revisando huecos, piedras y arbustos para alimento. Repetidos y fuertes *chip.., tio, tuit..* Cuando canta coloca la cola hacia abajo y la cabeza hacia arriba.

PEQUEÑO

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Matt Denton

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Sittasomus griseicapillus

Guirí – Arapasu pytâmi – Olivaceous Woodcreeper

IDENTIFICACIÓN:

Plumaje pardo oliváceo uniforme, pero alas y cola de color rufo castaño. Pico negruzco, corto y recto (1,5 cm). Cola algo larga

ESPECIES SIMILARES:

Es el trepador más chico que hay en Paraguay en general. Inconfundible con otros trepadores.


COMPORTAMIENTO:

Comúnmente solitario, aunque a veces en grupos mixtos. Recorre ágilmente los troncos verticalmente, generalmente en el estrato medio de la vegetación. Canto con agudos y separados *fui..fui..*, acelerando.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Roberto González

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Xiphocolaptes major

Trepador gigante – Arapasu ñu – Great Rufous Woodcreeper

IDENTIFICACIÓN:

Color general castaño. Vientre más claro y cola poco más obscura. Loral y periocular negros. Pico grueso, un poco curvo y de color marfil.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna. Es el trepador más grande en el Paraguay.

COMPORTAMIENTO:

Trepa árboles, pero también de hábitos terrestres. Canta con serie de notas descendentes *pi..ku..pi..ku..pi..ku..*

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ENDÉMICO

ESTADO **LC**



© Tatiana Galluppi

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Drymornis bridgesii

Chincherro grande – Arapasu guasu – Scimitar-billed Woodcreeper

IDENTIFICACIÓN:

Trepador grande con pico negro, largo y curvado. Semico-petón. Notable ceja blanca. Garganta y faja malar también blanca. Vientre escamado. Cabeza, alas y cola rufa castaña.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna. Su largo pico negro curvado y líneas blancas en la cara son bien características.

COMPORTAMIENTO:

Trepa en árboles y ramas, pero también bastante terrestre. A menudo en pareja. Voz un repetido y estridente *ruis..*, acelerando.

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ENDÉMICO

ESTADO **LC**



© Hugo Cabral

NIDIFICACIÓN




ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN HÁBITAT



Lepidocolaptes angustirostris

Chincherro chico – Arapasu Ka'atí – Narrow-billed Woodcreeper

IDENTIFICACIÓN:

Ceja ancha y blanca, garganta también blanca. Leve escamado en el vientre. Pico levemente curvado, color marfil. Espalda, alas y cola rufa castaña.

ESPECIES SIMILARES:

El canto y el rufo en la espalda, alas y cola pueden confundir con el Picopalo colorado (*Campylorhamphus trochilirostris*) sin embargo, esta tiene un pico largo, curvado y de color rojo

COMPORTAMIENTO:

Solitario o en pareja. Recorre en forma ascendente troncos y ramas. Serie de notas descendentes *pié..* y bisilábico *pieé..juí..*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Rodolfo Ruiz

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN HÁBITAT



Campylorhamphus trochilirostris**Picapalo colorado – Arapasu juru karapâ – Red-billed Scythebill****IDENTIFICACIÓN:**

Color general rufo. Inconfundible, muy largo y delgado. Pico largo y muy curvado de color rojo.

ESPECIES SIMILARES:


Visto de espalda recuerda al Chinchero chico (*Lepidocolaptes angustirostris*), pero esta no tiene el pico curvado de color rojo y además es más estriado.

COMPORTAMIENTO:

Solitario o en pareja, a veces en bandadas de otras especies. Busca pequeños invertebrados con su pico en orificios y rajaduras de troncos. Canto con característico *kié.. kié.. kié..* ascendente.

PEQUEÑO**OCURRENCIA R****ESTADO LC**

© Guillermo Menendez

NIDIFICACIÓN**ABUNDANCIA****COMP. SOCIAL****ALIMENTACIÓN HÁBITAT*****Batara cinerea*****Batará gigante – Mbatara guasu – Giant Antshrike****IDENTIFICACIÓN:**

Grande. Macho: Notable copete negro. Pico robusto y con gancho. Dorso negro y barrado de blanco. Vientre ceniciento. Hembra: copete castaño, dorso canela barrado de negro y vientre gris ocráceo.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Confiado pero oculto, más oído que visto. Muy fuerte *klu..arr..* y otras voces.

PEQUEÑO**OCURRENCIA R****ESTADO LC**

© Paulo Norberg

NIDIFICACIÓN**ABUNDANCIA****COMP. SOCIAL****ALIMENTACIÓN HÁBITAT**

Taraba major

Chororó – Great Antshrike

IDENTIFICACIÓN:

Pico negro y robusto. Iris rojo. Dorso negro, con notables filetes blancos en cubiertas. Ventral blanco con cola barrada de negro. Hembra: dorso castaño, alas sin filetes y cola rufa sin barrado.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Muy curioso, relativamente fácil de ver. Terrestre y de matorrales. De canto fuerte y melancólico *choc.. choc.. chrrr..* como una matraca, y otras voces.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Guillermo Menéndez

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Thamnophilus doliatus

Batará rayado – Che oro para – Barred Antshrike

IDENTIFICACIÓN:

Macho: Todo el plumaje color negro barrado de blanco. Semicopete eréctil y negro. Iris marfil y patas celestes. Hembra distinta: Semicopete y dorso rufo. Pecho acanelado. Cara y cuello grises estriados de negro.

ESPECIES SIMILARES:

Macho inconfundible. Hembra algo semejante a la hembra del Batará pardo (*Thamnophilus sticturus*), pero esta carece el barrado en la cara y es menos rufo en el cuerpo.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente en pareja, buscando alimentos en partes bajas de follaje denso. Balancea la cabeza y menea la cola. Melodioso *fío..* y series rítmicos de cloqueos hechos a menudo a dúo, que aceleran y bajan, concluyendo en una nota conspicua.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Guillermo Menéndez

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Thamnophilus sticturus

Batará pardo – Mbatara – Bolivian Slaty Antshrike

IDENTIFICACIÓN:

Macho: Dorsal plumizo, frente y vientre gris. Corona negra. Cubiertas negras con filetes blancos, remeras y timoneras negras. Mancha negra en medio de las timoneras externas. Hembra: Dorso castaño y vientre ocráceo acanelado. Corona rufa.

ESPECIES SIMILARES:

Parecido al Batará plumizo (*Thamnophilus caerulescens*), pero esta carece de las manchas negras y blancas al final de la nuca y no menea la cola. La hembra del Batará plumizo tiene una corona rufa mucho menos intensa.


COMPORTAMIENTO:

Notable balanceo de la cola. Serie de notas que acelera, terminando en trino. Llamada *heeeh*.. más aguda que Batará plumizo.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Arne Lestherhuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Thamnophilus caerulescens

Batará plumizo – Viro'o guasu – Variable Antshrike

IDENTIFICACIÓN:

Macho: Dorsal plumizo. Vientre gris claro, blancuzco a canela. Pecho gris. Corona y cola negra. Cubiertas negras con filetes blancos, timoneras escalonadas con ápices blancos. Hembra: dorso pardo o gris oliváceo, ventral acanelado. corona castaña.

ESPECIES SIMILARES:

Muy parecido al Batará pardo (*Thamnophilus sticturus*), pero esta tiene unas manchas blancas y negras al final de la nuca. Además, la hembra del Batará pardo tiene una corona rufa (no castaña).

COMPORTAMIENTO:

Generalmente solitario o en pareja. Bastante manso, recorriendo lentamente la vegetación tupida y baja. Nasal *eee*.. como gatito.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Jorge La Grotteri



© Matt Denton

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Myrmochilus strigilatus

Batará estriado – Piu piu – Stripe-backed Antbird

IDENTIFICACIÓN:

Dorsal estriado de rufo y negro. Notables filetes y puntos blancos en cubiertas. Cola rufa con timoneras externas negras, de ápices blancos. Macho con amplio barbero negro contrastado con ventral blancuzco, hembra sin barbero, pero con el pecho estriado de negruzco.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente solo o en pareja, más oído que visto. Confiada, bien terrestre. Fuerte *chiá...* fino silbo trisilábico, melancólico.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **NT**



© Oscar Bordón

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Formicivora melanogaster

Batará vientre negro – Mbatara – Black-bellied Antwren

IDENTIFICACIÓN:

Notable blanco en ceja, que baja como línea hasta los flancos blancos, separando dorso gris pardusco del vientre negro. Filetes en cubiertas y bordes de timoneras externas blancos. Hembra con dorso pardo, la ceja blanca sólo llega hasta la nuca, garganta blanca y ventral ocráceo blancuzco.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente solo o en pareja. Forrajea en vegetación densa en el substrato bajo. Serie de *tchk..*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Rhinocrypta lanceolata

Gallito copetón – Mburika mondoa – Crested Gallito

IDENTIFICACIÓN:

Notable copete y cuello parados, muy estriados de blanco. Dorso gris oliváceo. Ventral blancuzco. Flancos rufos. Cola negra algo larga, erecta.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Terrestre. Corre por los claros. A veces en lo alto de arbustos de donde salta al suelo. Más oído que visto. Sonoro y suave *churup..* o *chío..*

MEDIANA

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Melanopareia maximiliani

Gallito de collar – Guyra'i ñu – Olive-crowned Crescentchest

IDENTIFICACIÓN:

Llamativa coloración. Notable ceja larga y garganta acaneladas, separadas por antifaz negro. Collar negro. Dorsal pardo oliváceo. Vientre rufo. Cola larga y redondeada.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Más bien oculto, generalmente en parejas. Percha en ramas bajas en vegetación densa. Su canto es un agudo y metálico *Püpüpüpüpüp..* con resonancia de rana. No eleva la cola.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Oscar Bordón

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Elaenia spectabilis

Fiofio grande – Guyra káva – Large Elaenia

IDENTIFICACIÓN:

Dorso pardo oliváceo. Semicopete poco notable, con corona blanca oculta. Con tres filetes blancuzcos en cubiertas, a veces sólo dos visibles. Vientre con amarillo claro que penetra en forma de un leve estriado en el pecho, el cual posee color gris uniforme.

ESPECIES SIMILARES:

Varias. Fiofio copetón (*Elaenia flavogaster*) es muy raro en el Chaco seco paraguayo, tiene el copete más notable y dos filetes en cubiertas. Fiofio pico corto (*Elaenia parvirostris*) tiene el pico más corto y es un poco menor y menos amarillo en el vientre. Fiofio silbón (*Elaenia albiceps*) tiene semicopete dividido por un triángulo blanco, aunque se lo ve en Paraguay solo entre marzo y noviembre. Parecido al Suiriri pico corto pero esté tiene el pico más corto y más chico de tamaño.

COMPORTAMIENTO:

En pareja o solitario. Posa en copas de árboles. Bastante inconspicuo. Explosivo silbo *Pfeu...* o *fuiu...*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **AN**

ESTADO **LC**



© Marcelo Allende

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Camptostoma obsoletum

Piojito silbón – Southern Beardless-tyrannulet

IDENTIFICACIÓN:

Notable semicopete eréctil. Dorso pardusco. Filetes ocráceos o canelas en cubiertas y remeras internas. Vientre blancuzco, agrisado en pecho. Mandíbula canela.

ESPECIES SIMILARES:

Parece un pequeño Suiriri de vientre blanco (*Suiriri suiriri*). Se puede confundir con *Serpophaga* sp. de los cuales 3 especies pueden ser observadas en el área: Piojito trinador (*Serpophaga griseiceps*), Piojito vientre blanco (*S. munda*) y Turi turi (*S. subcristata*). Sin embargo, las 3 tienen filetes blancos o claros y pico negro. También muy similar al Piojito picudo (*Inezia inornata*) que es más amarillento en el vientre y tiene el pico más grueso.

COMPORTAMIENTO:

Recorredor. De postura erguida, elevando la cola. Silbo *fiit...* además, serie de notas cortas como risita aguda (similar al Suiriri real *Tyrannus melancholicus*).

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Alec Earnshaw

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Suiriri suiriri**Suiriri vientre blanco – Suiriri Flycatcher****IDENTIFICACIÓN:**

Dorsal gris parduzco. Alas y colas negruzcas. Notables filetes blancuzcos en cubiertas y remeras internas. Vientre blanco, algo gris en pecho y amarillento en abdomen. Pico negro.

ESPECIES SIMILARES:

Difícil de confundir teniendo en cuenta su canto. El Piojito silbón (*Camptostoma obsoletum*) se le parece en plumaje y compartimiento, pero es notablemente menor y tiene una semicopete. El Piojito vientre blanco (*Serpophaga munda*) es muy similar también, pero mucho más chico y forrajea en arbustos más bajos.

COMPORTAMIENTO:

Solitario o en pareja. Grupos ruidosos. Vuelo elástico, busca insectos en las copas de árboles y arbustos. Fuerte, corto y nasal *eu..* además *tío..tío..prrr..* (tono nasal también) y otras voces.

PEQUEÑO**OCURENCIA R****ESTADO LC**

© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT

***Serpophaga munda*****Piojito vientre blanco – Sipiruru mi – White-bellied Tyrannulet****IDENTIFICACIÓN:**

Muy pequeño. Dorso plumizo. Filetes blancos en cubiertas negruzcas. Pecho gris que pasa a blanco en resto ventral. Pico cortito negro.

ESPECIES SIMILARES:

Parece un diminuto Suiriri vientre blanco (*Suiriri suiriri*), pero no le llega a la mitad del tamaño y tiene una corona blanca escondida. También al Piojito trinador (*Serpophaga griseiceps*) que es del mismo tamaño, pero tiene una voz distinta (un descendiendo *prrrrrrrrr*) y tiene amarillo en el vientre.

COMPORTAMIENTO:

Solitario o en pareja. Forrajea en arbustos y vegetación baja. Su voz es un suave *chin churiza...* muy similar al Turi turi (*Serpophaga subcristata*).

PEQUEÑO**OCURENCIA AS****ESTADO LC**

© Jorge Martín Spinuzza

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Serpophaga griseicapilla

Piojito trinador – Gray-crowned Tyrannulet

IDENTIFICACIÓN:

Muy pequeño. Toda la corona gris con blanco, oculto o difícil de ver. Dorso gris algo oliváceo. Filetes claros en cubiertas negras. Pecho gris que pasa a amarillento en el resto del vientre

ESPECIES SIMILARES:

Muy parecido al Piojito vientre blanco (*Serpophaga munda*), pero carece el vientre amarillento y tiene otra voz (*chin churiza...*). También muy similar al Turí turí (*Serpophaga subcristata*), que también tiene amarillo en el vientre, pero tiene otra voz y se lo ve poco en la región chaqueña.

COMPORTAMIENTO:

Solitario o en pareja. Forrajea en arbustos y vegetación baja. Muy recorridor. Voz un aguda *ti trrrrrrrr*.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **AM**

ESTADO **LC**



© Paul Smith

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Pseudocolopteryx dinelliana

Doradito pardo – Dinelli's Doradito

IDENTIFICACIÓN:

Corona parda. Leve ceja amarillenta. Dorso pardo algo oliváceo (más pardo). Garganta de color amarillo oro, más oliváceo en resto ventral. Generalmente muestra dos filetes más claros en las cubiertas.

ESPECIES SIMILARES:

Se podría confundir esta especie con tres otras especies del mismo género. El Doradito corona castaña (*P. flaviventris*) y Doradito limón (*P. citreola*) son de un color más pardo y ambos tienen una corona castaña notable. El Doradito oliváceo (*P. acutipennis*) es muy similar al Doradito pardo, pero es más oliváceo y generalmente no muestra filetes claros en cubiertas.

COMPORTAMIENTO:

Solitario o en pareja. Forrajea en vegetación densa, a veces saliendo por cortos ratos. Más oído que visto. Fuerte y complejo *chek..chek..churri..churri..*. En vuelo voz *chik..*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **AM**

ESTADO **NT**



© Paul Smith

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Euscarthmus meloryphus

Barullero – Guyra ka'i – Tawny-crowned Pygmy-Tyrant

IDENTIFICACIÓN:

Coloración modesta, salvo corona anaranjada semioculta. Dorsal pardo uniforme. Loral ocráceo. Ventral blancuzco que llega a amarillento en el abomen.

ESPECIES SIMILARES:

Parece en tamaño y comportamiento a la Mosqueta ojo dorado (*Hemitriccus margaritaceiventer*), pero tiene el dorso oliváceo, filetes claros en cubiertas y el iris dorado, muy notable.

COMPORTAMIENTO:

Mucho más oído que visto. Se mueve en el substrato bajo de vegetación densa. Fuerte y repetido *prrrikechikek...*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Alec Earnshaw

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Stigmatura budytoides

Calandrita – Tacoita – Greater Wagtail-Tyrant

IDENTIFICACIÓN:

Dorsal gris oliváceo. Notable reborde en cubiertas y remeras internas. Llamativa cola larga, a menudo en posición erecta (como una calandria), con ápice blanco. Visibles cejas. Vientre amarillo.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente en pareja o grupos. Bullanguera. Rápido y fuerte *quirquincho...* a dúo, con la cola erecta.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Guillermo Menéndez

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Sublegatus modestus

Suirirí pico corto – Southern Scrub-flycatcher

IDENTIFICACIÓN:

Pico corto y negro. Semico-
pete. Sin periocular ni corona
oculta. Leve ceja y filetes en
cubiertas y remeras internas,
blancuzcos. Pecho gris, resto
de vientre amarillento.

ESPECIES SIMILARES:

Parece a las especies de *Ele-
ania*, pero es más chico, pico
corto y semicopete

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja. Posado en
sitios visibles de vegetación
arbustiva y árboles. No canta
mucho, pero emite un caracte-
rístico silbido fiii.....

PEQUEÑO

OCURRENCIA **AN**

ESTADO **LC**



© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Inezia inornata

Piojito picudo – Sipiruru pyti'a ju – Plain Tyrannulet

IDENTIFICACIÓN:

Muy similar a los Piojitos (*Serpophaga* sp.) pero pico más robus-
to. Ceja blanquecina no promi-
nente, corona sin rayas negras.

ESPECIES SIMILARES:

Muy parecido al Piojito trinador
(*Serpophaga griseicapilla*) pero
tiene voz distinta. También si-
milar al Piojito vientre blanco
(*Serpophaga munda*), pero no es
blanco en la parte del vientre y
tiene otra voz (*chin churisa...*).

COMPORTAMIENTO:

Generalmente solitario. Recorre
arbustos y árboles bajos. La voz
un suave y agudo *uiirrrr...* sin el *ti..*
al inicio como el Piojito trinador.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **AN**

ESTADO **LC**



© Carlos Henrique

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Hemitriccus margaritaceiventer

Mosqueta ojo dorado – Ñakya'i – Pearly-vented Tody-Tyrant

IDENTIFICACIÓN:

Cabeza grande, gris. Dorso oliváceo. Dos filetes claros en cubiertas. Ventral blancuzco poco estriado de gris en garganta y pecho. Pico algo largo, castaño. Iris dorado, bien llamativo.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna. Su tamaño e iris dorado son bien característicos.

COMPORTAMIENTO:

Solitario. Confiado. Recorre con cortos vuelos arbustos y árboles bajos en búsqueda de insectos. Más oído que visto. Fuerte *chic..chic..chierr..* y otras voces.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Guillermo Menéndez

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Empidonax alnorum

Mosqueta boreal – Alder Flycatcher

IDENTIFICACIÓN:

Postura erecta. Coloración modesta. Dorsal pardusco. Dos filetes blancos en alas negruzcas. Vientre blancuzco, más grisáceo en pecho y algo amarillento en abdomen. Mandíbula clara.

ESPECIES SIMILARES:

Recuerda a una especie de Fiofío (*Elaenia* sp.) pero es más chico y los filetes blancos en las cubiertas son bien característicos. Idéntico a *Empidonax traillii*, pero esta no se registró en el Paraguay. Sólo se puede diferenciar por la voz.

COMPORTAMIENTO:

Pasiva. Balancea la cola. Posa generalmente en la sombra de árboles y arbustos, no a mucha altura. No frecuenta muchos lugares expuestos.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **N**

ESTADO **LC**



© Mark Dennis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Pyrocephalus rubinus

Churrinche – Guyra tata – Vermilion Flycatcher

IDENTIFICACIÓN:

Macho muy llamativo. Notables corona, copete y ventral rojos. La hembra sin rojo, de dorso gris pardusco, pecho estriado de gris y subcaudal rosáceo. Juveniles como la hembra, pero con subcaudal amarillento.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente solitario o en pareja. Se exhibe. Corto vuelo elástico, cazando insectos en vuelo. Suave *pint.* y *ch.* *churrin* en vuelo nupcial.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **AS**

ESTADO **LC**



© Jorge Martín Spinuzza



© Paulo Norberg

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Knipolegus striaticeps

Viudita chaqueña – Chôcho – Cinereous Tyrant

IDENTIFICACIÓN:

Macho plumizo oscuro, cara y cola negruzcas, filetes grisáceos en cubiertas e iris rojo. Hembras con estriado ventral fino, dorso pardo oliváceo, corona canela y timoneras marginadas de rufo. Iris como el del macho.

ESPECIES SIMILARES:

Machos de otras especies de *Knipolegus* en la región son negros, no plumizos. Las hembras tienen menos estriados y tienen el pecho y abdomen más acanelado, con rabadilla rufa.

COMPORTAMIENTO:

En pareja o solitario. Canto en la copa de arbustos o árboles. Vuelo nupcial en caída, cola y alas verticales. Trino apagado.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **AS**

ESTADO **LC**



© Karina Diarte



© Arne Lestehuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Myiodynastes maculatus

Pitogüé rayado – Vichi vichi para – Streaked Flycatcher

IDENTIFICACIÓN:

Robusto, silueta de Pitogüé (*Pitangus sulphuratus*). Pico largo y grueso. Ventral blanquecino, pero con abundantes estrias oscuras. Dorso también estriado. Ceja no tan larga. Cola y algo de la rabadilla con castaño.

ESPECIES SIMILARES:

Parecido al Tuquito rayado (*Empidonamus varius*), pero este es más chico y delgado (no tiene la silueta del Pitogüé) y con el pico mucho más corto y fino.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja. Bullanguero. Inquieto. Sonoros *kuit.. i.. y rec..*. Repetido *uiro...uiro...uit..*.

PEQUEÑO

 OCURRENCIA **AN**

 ESTADO **LC**


© Paulo Norberg

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Empidonamus varius

Tuquito rayado – Suirirití – Variegated Flycatcher

IDENTIFICACIÓN:

Pico corto y fino. Semicopete. Cabeza negruzca con ceja larga y malar blancos. Corona oculta dorada. Dorso negruzco con leve escamado. Rabadilla rufa. Timoneras rufa y negra. Ventral blancuzco con grueso estriado pardo. El juvenil sin estrias.

ESPECIES SIMILARES:

Parecido al Pitogüé rayado (*Myiodynastes maculatus*), pero es más grande y con el pico más largo y grueso.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente solitario. Confiado. Pasivo. Posa en árboles y arbustos, en ramas expuestas. Caza en vuelo. Fuerte *chic..* y silbo agudo.

PEQUEÑO

 OCURRENCIA **AN**

 ESTADO **LC**


© Luis Ureña

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Griseotyrannus aurantioatrocristatus

Tuquito gris – Suiriri hû – Crowned Slaty Flycatcher

IDENTIFICACIÓN:

Plumaje de color gris pardusco casi uniforme. Ventral más grisáceo. Corona negra con centro amarillo oculto. Ceja gris. Juveniles con ceja más blanquecino y filetes rufos en remeras y timoneras.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja. Muy confiado en sitios visibles (ej. alambres), poco activo. Desde su percha realiza cortos vuelos para cazar insectos. Voz un grillado *yiit..*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **AN**

ESTADO **LC**



© Tatiana Galluppi

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Tyrannus melancholicus

Suiriri real – Suiriri guasu – Tropical Kingbird

IDENTIFICACIÓN:

Capuchón gris. Corona anaranjada oculta. Dorso y pecho gris oliváceo. Resto del vientre amarillo oro. Cola triangular y levemente furcada.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente solitario o en pareja. Posa en sitios visibles y altos, cazando insectos en vuelo, realizando cortos y ágiles vuelos. Voz rápida, aguda y casi trinado *síiriri...*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **AN**

ESTADO **LC**



© Guillermo Menéndez

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Tyrannus savana**Tijereta – Tuguái jetapa – Fork-tailed Flycatcher****IDENTIFICACIÓN:**

Inconfundible. Cabeza y larguísima cola (28 cm) negras. Corona amarilla oculta. Dorso gris. Vientre blanco. En hembras la cola es menor (14 cm). Juveniles con cola normal.

ESPECIES SIMILARES:

Las juveniles y adultos que perdieron las plumas largas de la cola son muy similares al Suiriri boreal (*Tyrannus tyrannus*), pero esta tiene una cola negra con ápice blanco y todo el dorso plumizo oscuro.

COMPORTAMIENTO:

Solitario o en pareja, a veces en bandadas (en particular durante época de migración). Posa en lugares visibles, cazando insectos en vuelo desde su percha. Su voz es una serie de notas repetidas rápidamente *Tec tec trrrrrrrrrrr* (muy secas y ásperas).

GRANDE**OCURRENCIA AN****ESTADO LC**

© Tatiana Galluppi

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT

***Casiornis rufus*****Burlisto castaño – Rufous Casiornis****IDENTIFICACIÓN:**

Dorso rufo. Más notable en semicopete, cubiertas y cola. Vientre ocráceo acanelado en pecho y subcaudal. Pico de base canela y ápice negro.

ESPECIES SIMILARES:

Bastante parecido al Burlisto de cabeza gris (*Attila phoenicurus*) y a la hembra del Anambé grande (*Pachyramphus validus*) pero ambos tienen un color plumizo en la cabeza.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente solitario, a veces en pareja. Posa en arbustos y árboles a media altura preferiblemente. Secuencia bisilábica descendiente de silbos agudos.

PEQUEÑO**OCURRENCIA R****ESTADO LC**

© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Myiarchus swainsoni

Burliso pico canela – Kuárekra – Swainson's Flycatcher

IDENTIFICACIÓN:

Mandíbula total o basalmente de color canela claro. Dorsal, corona y copete pardos, pero rabadilla algo canela. Filetes claros en cubiertas y remeras internas. Pecho y garganta blanquecino, resto vientre amarillo claro.

ESPECIES SIMILARES:

Muy similar a otras especies de *Myiarchus* pero las otras tienen pico todo oscuro (*M. tyrannulus* y *M. ferox*). Se diferencia además del Burlisto de cola castaña por tener la cola y primarias sin rufo.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja, a veces en bandadas mixtas. Caza insectos, pero también bastante frugívoro. Voz un melancólico y gutural mauuuu....

PEQUEÑO

OCURRENCIA **AN**

ESTADO **LC**



© Aaron Maizlish

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Myiarchus tyrannulus

Burlisto cola castaña – Ykua – Brown-crested Flycatcher

IDENTIFICACIÓN:

Cabezón, pico todo negro. Filetes claros en cubiertas y remeras internas. Filetes rufos en primarias, poco notables. Márgenes de timoneras rufos, visibles ventrales.

ESPECIES SIMILARES:

Muy similar a otras especies de *Myiarchus* pero el rufo en la cola y las primarias es bien característico.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja. Posa en lugares expuestos de árboles y arbustos. Caza insectos del follaje, a veces en vuelo. Silbos cortos y repetidos kuit.....kuit...

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Jorge Martín Spinuzza

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Cyclarhis gujanensis**Juan Chiviro – Chiviro – Rufous-browed Peppershrike****IDENTIFICACIÓN:**

Corona parda, ceja castaña y cara cenicienta. Dorso oliva, pecho amarillento y pico rosáceo nacarado. Iris anaranjado.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja. Más oído que visto. Confiado. Pasivo. Recorre follaje de árboles y arbustos a altura media o alta. Rápido, fuerte y melancólico silbo *chibichibirio..* y otras voces audibles.

PEQUEÑO**OCURRENCIA R****ESTADO LC**

© Sergio Ríos

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT

***Vireo olivaceus*****Chiví Oliváceo – Juruviara – Red-eyed Vireo****IDENTIFICACIÓN:**

Esbelto. Pico robusto. Corona gris. Larga ceja blanca realzada por línea ocular y sobrecejas negras. Dorso oliva. Vientre blancuzco. Iris pardo.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna, la larga ceja blanca y corona gris son bien características.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja. Confiado, acrobático. Más oído que visto. Generalmente en follaje alto de árboles, pero también a media altura y a veces en arbustos. Incansable y fuerte *chiví.. chiviví..*

PEQUEÑO**OCURRENCIA AN****ESTADO LC**

© Frode Jacobsen

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Cyanocorax cyanomelas

Urraca morada – Aka'ê hû – Purplish Jay

IDENTIFICACIÓN:

Capuchón y barbero prominente negros. Pequeña cresta en la frente. Resto del plumaje un gris morado y más azul violácea en la parte posterior del cuerpo y la cola.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente en grupos pequeños de entre 4 a 6 individuos, a veces más. Recorren partes altas de árboles, a veces en el suelo. Variables y fuertes sonidos.

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Cyanocorax chrysops

Urraca común – Aka'ê para – Plush-crested Jay

IDENTIFICACIÓN:

Conspicua. Llamativa coloración. Corona y semicopete negros aterciopelados. Ceja y nuca celeste-liláceas. Dorso y barbero negro violáceos. Ápice caudal ancho y el resto de la ventral crema amarillento. Iris amarillo oro. Juvenil sin marcas celestes.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

En bandadas ruidosas de hasta 15 o más ejemplares. Se escucha su presencia de lejos. Silba e imita cantos. Muy curiosa y suele acercarse bastante.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Hirundo rustica

Golondrina tijerita – Mbyju'I jetapa – Barn Swallow

IDENTIFICACIÓN:

Cola larga y ahorquillada, negruzca con banda ventral blanca. Dorso y collar azules. Garganta rufa. Resto del vientre canela. Juvenil con cola más corta, frente y gargantas acaneladas y vientre ocráceo.

ESPECIES SIMILARES:

Parecido a la Golondrina rabadilla canela (*H. pyrrhonota*), pero tiene la rabadilla canela (como dice su nombre) y carece de la cola furcada.

COMPORTAMIENTO:

Caza insectos en el aire, a veces muy bajo. Bandadas de adultos y jóvenes. Voz suave *uituit..*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **N**

ESTADO **LC**



© Jorge Martín Spinuzza

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Cantorchilus guarayanus

Ratona pecho ocre – Kuruirusu – Fawn-breasted Wren

IDENTIFICACIÓN:

Ceja angosta y blanca. Cara blanca estriada de negro. Garganta ocrácea. Dorso pardo. Ala y cola barrada de negro. Pecho ocráceo, más acanelado en los flancos.

ESPECIES SIMILARES:

Más alargada que la Ratona común (*Troglodytes aedon*) ceja y cara de color blanco estriado de negro bien características.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja. Forrajea en arbustos densos y en el suelo. Más oído que visto. Voz distinta y llamativa que incluye *fee..feú..*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Guillermo Menéndez

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Polioptila dumicola

Tacuarita azul – Masked Gnatcatcher

IDENTIFICACIÓN:

Esbelta. Azulada. Macho con antifaz negro. Cola angosta algo erecta y negra, con timoneras externas blancas. Vientre más claro, que llega a blanco en abdomen. Filetes blancos en remeras internas. Hembra algo más pálida y sin antifaz.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente en pareja. Inquieta, recorredora, curiosa, saltando de rama a rama en árboles y arbustos. Canto delicado y variado, incluso imita.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Rodolfo Ruiz

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Turdus amaurochalinus

Zorzal mandioca – Havia korochire – Creamy-bellied Thrush

IDENTIFICACIÓN:

Loral negro. Pecho ceniciento que pasa a blancuzco en abdomen. Pico amarillo en el macho adulto. Pico oscuro en la hembra. Juvenil con pecho maculado.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en parejas. Pequeñas bandadas durante la época no reproductiva. Mucho balanceo caudal. Canto dulce. Voz *puk..* agudo maullido. En vuelo *pssib..*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Mimus saturninus**Calandria grande – Guyra ñe'engatu – Chalk-browed Mockingbird****IDENTIFICACIÓN:**

Dorso con leve estriado y vientre blancuzco. Cola larga, semierecta, con ápice de timoneras (salvo centrales), blanco. Conspicua ceja y ventral blancuzcos.

ESPECIES SIMILARES:

Aspecto y comportamiento como la Calandria real (*Mimus triurus*), pero sin blanco en las alas y en la cola solo las puntas blancas.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja. Confiada, terrestre y en arbustos. Canto agradable, imita otras especies.

PEQUEÑO**OCURRENCIA R****ESTADO LC**

© Nicolás Cantero

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT

***Mimus triurus*****Calandria real – Guyra pepoasakati – White-banded Mockingbird****IDENTIFICACIÓN:**

Dorso pardusco (sin estrias). Rabadilla rufa. Cola blanca con timoneras centrales negras y faja alar blanca muy notable, formando un diseño conspicuo durante el vuelo. Flancos ocráceos.

ESPECIES SIMILARES:

Aspecto y comportamiento como la Calandria grande (*Mimus saturninus*), pero el blanco en las alas y cola es muy característico de la Calandria real.

COMPORTAMIENTO:

Confiada, terrestre y en arbustos. Canto agradable, imita otras especies. Se observa durante gran parte del año, pero aún no se sabe si nidifica en el Paraguay.

PEQUEÑO**OCURRENCIA AS****ESTADO LC**

© Sergio Ríos

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Saltator aurantirostris

Pepitero de collar – Havia tyvyta – Golden-billed Saltator

IDENTIFICACIÓN:

Cara, lados del cuello y collar negros. Larga ceja postocular y garganta blancas o acaneladas. Vientre pardo acanelado. Pico anaranjado. Joven pico oscuro.

ESPECIES SIMILARES:

Parece una versión menos colorida y más grande del Pepitero chico (*Saltatricula multicolor*), pero no tiene los flacos de color canela y tiene un collar negro.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en parejas. Forrajea en árboles y arbustos y también en el suelo. Repetido silbo *bich.. bich..bichío..*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Paul Smith

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Saltatricula multicolor

Pepitero chico – Vira vira – Many-colored Chaco-Finch

IDENTIFICACIÓN:

Ceja postocular blanca. Cara negra, cuyo color se continua a los lados de la garganta blanca. Collar gris. Ventral pardo acanelado. Vientre pardo acanelado, que puede tener un centro blanco. Pico amarillo anaranjado con culmen negro. Cola negra con ápice externo blanco.

ESPECIES SIMILARES:

Parece un pequeño y más colorido Pepitero de collar (*Saltator aurantirostris*), pero carece del collar negro y el pico es amarillo con culmen negro (no todo anaranjado).

COMPORTAMIENTO:

Solo o en parejas. Bastante terrestre, o bajo en vegetación densa. Siempre cerca de arbustos. Vuelo corto y potente, balancea la cola. Repetido *vireo..*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ENDÉMICO

ESTADO **LC**



© Arne Lestherhuis

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Rhynchospiza strigiceps

Cachilo corona castaña – Stripe-capped Sparrow

IDENTIFICACIÓN:

Corona rufa oscura con centro gris. Hombros rufos. Ceja, malar, pecho y flancos grises. Resto ventral blancuzco. Bigotes negros. Cola algo larga.

ESPECIES SIMILARES:

Parecido al Bendito sea (*Zonotrichia capensis*), pero no tiene el cuello dorsal de color canela anaranjado, ni semicollar negro.

COMPORTAMIENTO:

Pocos registros en el Paraguay. Solo, en pareja o grupos pequeños. Forrajea en arbustos bajos y en el suelo. Continuo *tich..* corto y metálico.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo Cabral

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Lophospingus pusillus

Soldadito – Black-crested Finch

IDENTIFICACIÓN:

Notable copete, antifaz y garganta negros. Notable ceja y malar blancos. El resto ceniciento. La hembra es más pardusca (sin negro). Garganta blanca.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna, aunque en vuelo recuerda a un Monterita de cabeza negra (*Microspingus melano-leucus*).

COMPORTAMIENTO:

En pareja, pero durante la época no reproductiva en pequeñas bandadas mixtas. Terrestre y arborícola.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **AS**

ESTADO **LC**



© Jorge Martín Spinuzza

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Microspingus melanoleucus

Monterita cabeza negra – Chivi chivi – Black-capped Warbling-Finch

IDENTIFICACIÓN:

Cabeza negra. Dorso plumizo. Vientre blanco. Hembra más parda y con cabeza gris con algo de negro cerca el ojo. Juvenil similar a la hembra.

ESPECIES SIMILARES:

Recuerda al Tacuarita azul (*Poliophtila dumicola*), pero cola más corta y algo más grande.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente en bandadas pequeñas, a veces solo o en pareja. Confiada, curiosa, recorredora. Repetido y sonoro *tsp.*

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ENDÉMICO

ESTADO **LC**



© Guillermo Menéndez

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Poospiza torquata

Monterita de collar – Ringed Warbling-Finch

IDENTIFICACIÓN:

Notables ceja y garganta blancas. Sobreceja, antifaz y collar ancho negros. Faja en cubiertas y resto ventral blancos. Subcaudal rufo. Hembra más pálida.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna. A menudo en bandadas de la Monterita cabeza negra (*Microspingus melanoleucus*), pero se distingue por su notable ceja blanca y subcaudal rufo.

COMPORTAMIENTO:

Solo, en pareja o en pequeñas bandadas. Recorredora, buscando alimentos en vegetación baja como arbustos y árboles chicos.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Jorge Martín Spinuzzi

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Sicalis flaveola

Canario Paraguayo – Tuju – Saffron Finch

IDENTIFICACIÓN:

Macho amarillo oro. Frente algo anaranjado en plumaje de reproducción. Dorso oliva estriado de negro. Alas y cola negras con rebordes amarillos. Hembras y juveniles algo distintos, sin amarillo, con el dorso gris pardusco estriado de negro, y vientre blancuzco con pecho y flancos estriados.

ESPECIES SIMILARES:

Las hembras parecen al Volatinero (*Volatinia jacarina*), pero esta especie carece de estrias en la parte dorsal, sin amarillo en el borde de las primarias.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente en pareja o bandadas, tanto de una especie como mixtas. Bastante arborícola, pero también terrestre. Canta mucho y en cualquier momento del día.

PEQUEÑO

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Volatinia jacarina

Volatinero – Jakarimi – Blue-black Grassquit

IDENTIFICACIÓN:

Pico agudo, cónico. Macho negro azulado brillante. Notables manchas blancas en las axilares al abrir el ala. Hembra de dorso pardo, ventral ocráceo. Pecho estriado, a menudo con plumajes intermedios.

ESPECIES SIMILARES:

El macho con ninguno en el Chaco seco. La hembra tiene algo de semejanza con la hembra de la Brasita de fuego (*Coryphospingus cucullatus*), pero carece el periocular blanco. También muy parecido a la hembra del Canario paraguay (*Sicalis flaveola*) pero esta es estriado la parte ventral y dorsal, y no solo en la parte ventral como la hembra Volatinera.


COMPORTAMIENTO:

Activo. Continuos y cortos saltos verticales desde su percha, emitiendo un chirrido metálico y haciendo más notables sus axilares y tapadas blancas. La hembra es más pasiva, no salta. Generalmente en bandadas.

PEQUEÑO

OCURENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Paulo Norberg

© Alec Earnshaw

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Sporophila leucoptera

Corbatita blanco – White-bellied Seedeater

IDENTIFICACIÓN:

Pico anaranjado oscuro, menos colorido en el invierno. Dorso plumizo. Vientre y notable banda alar blancos. Hembra con vientre acanelado, pico negro y el dorso más pardo.

ESPECIES SIMILARES:

Macho inconfundible. Hembra difícil de distinguir de otras especies de corbatita (*Sporophila* sp.).

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja, a menudo también en bandadas de otras corbatitas u otras especies. Lento y repetido silbo *fuiiit*..

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Paulo Norberg

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Coryphospingus cucullatus

Brasita de fuego – Guyra pyta'i – Red-crested Finch

IDENTIFICACIÓN:

Macho con semicopete rojo brillante eréctil. Rabadilla y ventral rojo carmín. Periocular y mandíbula blancos. Hembra con plumaje más pálido, sin rojo brillante, pero con periocular blanco.

ESPECIES SIMILARES:

Machos inconfundibles. Hembra puede ser confundida por la hembra del Volatinero (*Volatinia jacarina*), que también tiene un plumaje pardo, pero tiene el pecho estriado y carece del periocular blanco.

COMPORTAMIENTO:

Solitario o en pareja, frecuentemente en bandadas mixtas. Terrestre y arbustivo, muy inquieto, recorriendo partes bajas en vegetación arbustiva densa. Canto un chistido *chip*..

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Clyde Morris

© Hugo del Castillo

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Pheucticus aureoventris

Rey del bosque – Guyratañe – Black-backed Grosbeak

IDENTIFICACIÓN:

Pico muy grueso de color grisáceo. Macho negro, con hombros y vientre desde el pecho amarillo oro. Notables manchas alares y ápice de timoneras externas blancas. Hembra más parda y con pecho manchado.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja. Forrajea en árboles y arbustos densos. Audible y melódico canto.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Marko Fast

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Cyanocopsa brissonii

Reinamora grande – Kai kai – Ultramarine Grosbeak

IDENTIFICACIÓN:

Macho de color azul oscuro. Pico muy grueso, negro. Periocular, amplia frente y hombros, celestes. Hembra y juvenil con dorso castaño y vientre canela. También con plumajes intermedios.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna en el Chaco seco de Paraguay. El color en combinación con el pico muy grueso es característico.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en parejas. Recorre vegetación densa, solo a veces en el suelo. Continua y melódica voz.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Hugo del Castillo



© Roberto Derna

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Setophaga pitiayumii

Pitiayumi – Pyti'ajumi – Tropical Parula

IDENTIFICACIÓN:

Dorso azulado con espalda oliva. Blanco en timoneras externas y en cubiertas. Vientre amarillo oro, anaranjado en pecho. Cola corta.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja. Frecuentemente en bandadas mixtas en las copas de árboles. Confiado. Inquieto. Recorredor. Trino muy agudo que sube y desciende, bien característico.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Rodolfo Ruiz

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Cacicus solitarius

Boyero negro – Guyraú chorê – Solitary Black Cacique

IDENTIFICACIÓN:

Fácil de reconocer. Todo negro con el pico de color marfil.

ESPECIES SIMILARES:

Inconfundible. No hay otras aves completamente negras y con pico claro en el Paraguay.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja. Acrobático, forrajea en árboles y vegetación baja. Canto bisilábicos y breves y roncós uegg.. Además, imita.

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Guillermo Menéndez

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Cacicus chrysopterus

Boyero ala amarilla – Guarani – Golden-winged Cacique

IDENTIFICACIÓN:

Plumaje negro, contrastando con cubiertas y amplia rabadilla amarillo oro. Mandíbula celeste.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en pareja. Forrajea a media altura en áreas semiabiertas. Nido negro. Maullido ronco y corto. Otras voces, incluso canto agradable.

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Vi Nevez

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



Icterus croconotus

Matico – Choe – Orange-backed Troupial

IDENTIFICACIÓN:

Muy llamativa coloración. Fuerte anaranjado, contrastando con el frente de la cara, pecho, manto, cola y alas, negros. Blanco en las remeras. Iris amarillo.

ESPECIES SIMILARES:

Ninguna.

COMPORTAMIENTO:

Solo o en parejas. Se alimenta entre los arbustos y árboles a altura media y baja. Silbo fuerte y melodioso, onomatopéyico *Troo troo pee oo* (Troupial)

MEDIANO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Guillermo Menéndez

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA




COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



IDENTIFICACIÓN:

Esbelto. Negro, sin brillo violáceo. Pico fino y recto. Cola notablemente larga. Hombros rufos poco visibles pero característicos. El ala en el vientre se ve blancuzca.

ESPECIES SIMILARES:

Aunque su plumaje negro recuerda a las varias especies de tordo (*Molothrus* spp.), carece del brillo azul, tiene la cola más larga y no se alimenta en bandadas ni en el suelo.

COMPORTAMIENTO:

Solitario o en pareja. Arborícola. Inquieto. Muy acrobático. Voces variadas, incluso imitando cantos de otras especies. Canto agradable.

PEQUEÑO

OCURRENCIA **R**

ESTADO **LC**



© Guillermo Menéndez

NIDIFICACIÓN



ABUNDANCIA



COMP. SOCIAL



ALIMENTACIÓN



HÁBITAT



AGRADECIMIENTOS

Esta pequeña contribución no hubiera sido posible sin el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCENCIA, Fomento a la investigación científica, mediante los Fondos Concursales para proyectos de Investigación y Desarrollo. Deseamos que el apoyo a la ciencia en Paraguay continúe, siga creciendo, y que programas como el mencionado sigan adelante.

Agradecemos al equipo técnico de Guyra Paraguay, quienes han sido siempre una fuente de inspiración y hemos compartido no solamente un lugar de trabajo, sino también varias aventuras de campo para este y otros proyectos. A Marcelo Arévalos quien con su paciencia y liderazgo en temas administrativos y financieros nos ha ayudado a alcanzar nuestras metas; y también al equipo administrativo de Guyra Paraguay. Muchas gracias al equipo del Programa "Conservación de Hábitats y Paisajes" por proveer información y mapas para los viajes al campo y la presente Guía. A Alberto Yanosky quien, desde la dirección ejecutiva, ha dedicado esfuerzo y compromiso para la conservación y educación a través de materiales como la presente Guía. A José Luis Cartes, por su apoyo para la realización del material. Un agradecimiento especial a todas las personas que nos acompañaron al campo en estos dos años, Marianela Velilla, Andrea Caballero, Silvana Rojas, Tatiana Galluppi y Christian López. Al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible por el apoyo a través de sus Guardaparques de los Parques Nacionales Teniente Enciso, Médanos del Chaco y Defensores del Chaco quienes nos han recibido y ayudado con profesionalismo y entusiasmo.

Como no agradecer a las aves, al fin y al cabo, son ellas las estrellas de este material, un agradecimiento al Chaco seco por permitirnos conocer todas sus maravillas, y aunque algunas veces nos puso a prueba con climas cambiantes siempre nos regalaba alguna sorpresa. Esperamos que contribuciones como estás generen conciencia sobre la importancia que tiene conservar los ambientes naturales, para poder seguir observado estas especies en sus hábitats naturales.

Por último, queremos agradecer a los autores de las fotografías de aves, gracias por proveer el material visual, para hacer posible esta obra, muchas gracias a Nicolás Cantero, Tatiana Galluppi, Hugo del Castillo, Paul Smith, Sergio Rios, Oscar Bordón, Guillermo Menéndez, Rodolfo Ruiz, Marko Fast, Paulo Norberg, Jorge La Grotteri, Alec Earnshaw, Mark Dennis, Jorge Martín Spinuzza, Frode Jacobsen, Aaron Mairish, Vi Nevez. Además, nuevamente a Paul Smith, gracias por permitirnos usar material de la página de Fauna Paraguay, a todas estas personas muchas gracias: Andy Holman, Nelson Pérez, Clyde Morris, Kevin Guest, Neil Poppendeck, Jerry Cooper, Silvia Centrón, Hemme Batjes, Frank Fragano, Clyde Morris, Roberto Derna, Karina Diarte, Matt Denton, Jonathan Newman y Jerry Cooper. Agradecemos también a la Sociedad Audubon, quienes han proveído material fotográfico para lograr el material a través de sus socios.

GLOSARIO

HABITAT

Bosque xerofítico chaqueño (alto y bajo): Conjunto de formaciones vegetales de clima árido y semiárido, típicamente arbustos y árboles leñosos.

Matorral: Chaparral espinoso del Chaco seco

Áreas convertidas – Pasturas: Tierras ganaderas y agrícolas, con vegetación modificada o exótica.

Humedales: Arroyos, lagunas, esteros, con o sin vegetación emergente, de agua dulce y lagunas de agua salada.

Poblados: Áreas pobladas por humanos (pueblos, establecimientos, cascos y retiros de estancias).

OCURRENCIA

R - Residente: Reproductor residente. Especie nidificante que se encuentra todo el año en el Paraguay.

AS - Migrador austral sureño: Especie que nidifica en el Paraguay, pero es más abundante durante el invierno, cuando arriban migrantes desde el sur de Suramérica.

AN - Migrador austral norteño: Especie que nidifica en el Paraguay, pero es menos abundante o ausente durante el invierno, cuando migran al norte hacia los trópicos.

N - Migrador neártico: Especie que nidifica en Norteamérica durante el verano boreal y luego migra al sur a zonas tropicales. En el Paraguay se encuentran especies migrantes (especies transitorias) en la primavera y otoño austral, y se observan individuos invernantes durante el verano austral.

AM - Migrador austral: Especie que nidifica al sur de Paraguay y luego migra al norte. En Paraguay se observan especies tanto migrantes (especies transitorias) como invernantes durante el otoño, invierno y primavera austral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arévalos, F., M. Baéz, E. Ortiz, A. Yanosky. 2015. Monitoreo de los cambios de uso de la tierra en el Gran Chaco. *Paraguaria Nat.* 3(2):6-11.
- Arévalos F, E. Ortiz, M., Baéz, C., Benitez, T., Paniagua. 2017. Monitoreo mensual del Cambio de Uso y Cobertura de Tierra, Incendios y Variación de la Cubierta de Aguas en el Gran Chaco Americano. Informe técnico presentado a Global Forest Watch and World Resource Institute. Asunción: Guyra Paraguay.
- Canevari, M., Canevari, P., Carrizo, G.R., Harris, G., Rodríguez Mata, J., & Straneck, R.J. 1991. Nueva Guía de las Aves Argentinas. Tomo I y II. Fundación Acindar.
- Base de Datos de Guyra Paraguay (BDGP). 2018. Inédito.
- BirdLife International. 2018. State of the world's birds: taking the pulse of the planet. Cambridge, UK: BirdLife International.
- Dinerstein, E., Olson, D., Graham, D., Webster, A., Primm, S., Bookbinder, M., Ledec, G. 1995. Una evaluación del estado de conservación de las ecorregiones terrestres de América Latina y el Caribe. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco Mundial. Washington, D.C.
- FAO. 2015. FRA 2015: Términos y Definiciones. Documento de Trabajo de la Evaluación de los Recursos Forestales. N° 180. Roma, Italia. 32 pp.
- Frate, L., A. T. R. Acosta, M. Cabido, L. Hoyos, and M. L. Carranza. 2015. Temporal Changes in Forest Contexts at Multiple Extents: Three Decades of Fragmentation in the Gran Chaco (1979-2010), Central Argentina. *Plos One* 10.
- Guyra Paraguay. 2005. Atlas de las Aves del Paraguay. Asunción, Paraguay.
- Guyra Paraguay. 2008. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves en Paraguay. 1ra. Ed. Guyra Paraguay/BirdLife International. Asunción.
- Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Komareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. *Science* 342:850-853.
- Kratter, A. W., T. S. Sillett, R. T. Chesser, J. P. O'Neill, T. A. Parker III, A. Castillo. 1993. Avifauna of a chaco locality in Bolivia. *Wilson Bull.* 105: 114-141.
- Kuemmerle, T., M. Altrichter, G. Baldi, M. Cabido, M. Camino, E. Cuellar, R. L. Cuellar, J. Decarre, S. Diaz, I. Gasparri, G. Gavier-Pizarro, R. Ginzburg, A. J. Giordano, H. R. Grau, E. Jobbagy, G. Leynaud, L. Macchi, M. Mastrangelo, S. D. Matteucci, A. Noss, J. Paruelo, M. Piquer-Rodriguez, A. Romero-Munoz, A. Semper-Pascual, J. Thompson, S. Torrella, R. Torres, J. N. Volante, A. Yanosky, and M. Zak. 2017. Forest conservation: Remember Gran Chaco. *Science* 355:465-465.
- Mereles, F., J.L. Cartes, R.P. Clay, P. Cacciali, C. Paradedá, O. Rodas, A. Yanosky. 2013. Análisis cualitativo para la definición de las ecorregiones de Paraguay occidental. *Paraguaria Nat.* 1(12): 12-20.
- Narosky, T. & D. Yzurieta. 2006. Guía para la indentificación de las Aves de Paraguay. Vazquez Mazzini Ed. Asunción, Paraguay, 240pp.
- Nori, J., R. Torres, J. N. Lescano, J. M. Cordier, M. E. Periago, and D. Baldo. 2016. Protected areas and spatial conservation priorities for endemic vertebrates of the Gran Chaco, one of the most threatened ecoregions of the world. *Diversity and Distributions* 22:1212-1219.
- PNC ONU-REDD+ Py/SEAM/INFONA/FAPI. Paraguay: cambio de uso de suelo y costos de oportunidad. Sinergias entre REDD+ y la Ley de Valoración y Retribución de Servicios Ambientales. 2016. Asunción: FAO/PNUD/PNUMA.
- Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, C. D. Cadená, S. Claramunt, A. Jaramillo, J. F. Pacheco, M. B. Robbins, F. G. Stiles, D. F. Stotz, and K. J. Zimmer. Version (30 Octubre 2018). A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm>
- Secretaría del Ambiente. 2017a. Plan de Manejo del Parque Nacional Teniente Agripino Enciso. Secretaría del Ambiente/Fundación Moises Bertoni. Asunción, Paraguay. 213 pp.
- Secretaría del Ambiente. 2017b. Plan de Manejo del Parque Nacional Defensores del Chaco. Secretaría del Ambiente/Fundación Moises Bertoni. Asunción, Paraguay. 234 pp.
- Secretaría del Ambiente. 2017c. Plan de Manejo del Parque Nacional Médanos del Chaco. Secretaría del Ambiente/Fundación Moises Bertoni. Asunción, Paraguay. 247 pp.
- Vallejos, M., J. N. Volante, M. J. Mosciaro, L. M. Vale, M. L. Bustamante, and J. M. Paruelo. 2015. Transformation dynamics of the natural cover in the Dry Chaco ecoregion: A plot level geo-database from 1976 to 2012. *Journal of Arid Environments* 123:3-11.
- Zykowski, K., M.B. Robbins, A. Townsend Peterson, K.S. Bostwick, R.P. Clay, L.A. Amarilla. 2003. Avifauna of the Northern Paraguayan Chaco. *Ornitología Neotropical*. 14:247-262.

INDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

- Amazona aestiva*, 33
Aratinga nenday, 32
Asthenes baeri, 46
Batara cinerea, 51
Bubo virginianus, 35
Buteo albonotatus, 26
Buteogallus coronatus, 23
Cacicus chrysopterus, 79
Cacicus solitarius, 78
Campephilus leucopogon, 43
Camptostoma obsoletum, 56
Campylorhamphus trochilirostris, 51
Cantorchilus guarayanus, 69
Cariama cristata, 28
Casiornis rufus, 65
Cathartes aura, 21
Chaetura meridionalis, 38
Chlorostilbon lucidus, 39
Chondrohierax uncinatus, 22
Chordeiles minor, 37
Chunga burmeisteri, 29
Coccyzus americanus, 34
Coccyzus melacoryphus, 34
Columbina picui, 30
Columbina squammata, 29
Coryphistera alaudina, 47
Coryphospingus cucullatus, 76
Crypturellus undulatus, 18
Cyanocompsa brissonii, 77
Cyanocorax chrysops, 68
Cyanocorax cyanomelas, 68
Cyclarhis gujanensis, 67
Drymornis bridgesii, 50
Dryocopus schulzi, 43
Elaenia spectabilis, 56
Empidonax alnorum, 61
Empidonax varius, 63
Eudromia formosa, 20
Euscarthmus meloryphus, 59
Falco femoralis, 28
Falco sparverius, 27
Formicivora melanogaster, 54
Furnarius cristatus, 44
Geranoaetus albicaudatus, 25
Geranospiza caerulescens, 24
Glaucidium brasilianum, 36
Griseotyrannus aurantioatrocristatus, 64
Heliomaster furcifer, 39
Hemitriccus margaritaceiventer, 61
Herpetotheres cachinnans, 26
Hirundo rustica, 69
Hylocharis chrysura, 40
Icterus croconotus, 79
Icterus pyrrhopterus, 80
Ictinia mississippiensis, 22
Ictinia plumbea, 23
Inezia inornata, 60
Knipolegus striaticeps, 62
Lepidocolaptes angustirostris, 50
Leptotila verreauxi, 31
Lophospingus pusillus, 73
Megascops choliba, 35
Melanerpes cactorum, 42
Melanopareia maximiliani, 55
Microspingus melanoleucus, 74
Mimus saturninus, 71
Mimus triurus, 71
Momotus momota, 40
Myiarchus swainsoni, 66
Myiarchus tyrannulus, 66
Myiodynastes maculatus, 63
Myrmochilus strigilatus, 54
Nothoprocta cinerascens, 18
Nothura boraquira, 19
Nothura maculosa, 19
Nyctidromus albicollis, 37
Nystalus maculatus, 41
Ortalis canicollis, 20
Parabuteo unicinctus, 24
Patagioenas picazuro, 30
Phacellodomus rufifrons, 46
Phacellodomus sibilatrix, 47
Pheucticus aureoventris, 77
Picumnus cirratus, 41
Pionus maximiliani, 33
Polioptila dumicola, 70
Poospiza torquata, 74
Pseudocolopteryx dinelliana, 58
Pseudoseisura lophotes, 48
Pyrocephalus rubinus, 62
Rhinocrypta lanceolata, 55
Rhynchospiza strigiceps, 73
Rupornis magnirostris, 25
Saltator aurantioirostris, 72
Saltatricula multicolor, 72
Sarcoramphus papa, 21
Serpophaga griseicapilla, 58
Serpophaga munda, 57
Setopagis parvula, 38
Setophaga pitayumii, 78
Sicalis flaveola, 75
Sittasomus griseicapillus, 49
Spizapteryx circumcincta, 27
Sporophila leucoptera, 76
Stigmatura budytoides, 59
Strix chacoensis, 36
Sublegatus modestus, 60
Suiriri suiriri, 57
Synallaxis albescens, 45
Synallaxis albilora, 45
Synallaxis frontalis, 44
Taraba major, 52
Tarphononmus certhioides, 48
Thamnophilus caerulescens, 53
Thamnophilus doliatus, 52
Thamnophilus sticturus, 53
Thectocercus acuticaudatus, 32
Turdus amaurochalinus, 70
Tyrannus melancholicus, 64
Tyrannus savana, 65
Veniliornis mixtus, 42
Vireo olivaceus, 67
Volatinia jacarina, 75
Xiphocolaptes major, 49
Zenaida auriculata, 31

INDICE DE NOMBRES COMUNES

- Águila coronada, 23
Aguilucho alas largas, 25
Aguilucho negro, 26
Añapero boreal, 37
Atajacaminos chico, 38
Bandurrita chaqueña, 48
Barullero, 59
Batará estriado, 54
Batará gigante, 51
Batará pardo, 53
Batará plumizo, 53
Batará rayado, 52
Batará vientre negro, 54
Boyerito, 80
Boyero ala amarilla, 79
Boyero negro, 78
Brasita de fuego, 76
Búho, 35
Burgo, 40
Burliso pico canela, 66
Burlisto castaño, 65
Burlisto cola castaña, 66
Caburé, 36
Cacholote castaño, 48
Cachilo corona castaña, 73
Calandria grande, 71
Calandria real, 71
Calandrita, 59
Canario Paraguay, 75
Canastero chaqueño, 46
Carpinterito común, 41
Carpintero bataraz, 42
Carpintero del cactus, 42
Carpintero lomo blanco, 43
Carpintero negro, 43
Charata, 20
Chinchero chico, 50
Chinchero grande, 50
Chivi Oliváceo, 67
Chororó, 52
Churrinche, 62
Copetona, 20
Corbatita blanco, 76
Crestudo, 47
Cuclillo alas rojizos, 34
Cuclillo canela, 34
Cuervo cabeza roja, 21
Cuervo real, 21
Curiango, 37
Doradito pardo, 58
Durmili, 41
Espinero chico, 47
Espinero frente rojiza, 46
Fiofío grande, 56
Gallito copetón, 55
Gallito de collar, 55
Gavilán mixto, 24
Gavilán patas largas, 24
Golondrina tijerita, 69
Guaicurú, 26
Guirí, 49
Halconcito colorado, 27
Halconcito gris, 27
Halcón plumizo, 28
Hornerito copetón, 44
Jeruti común, 31
Juan Chiviro, 67
Lechucita común, 35
Lechuza chaqueña, 36
Loro choclero, 33
Loro hablador, 33
Maracanã cabeza azulada, 32
Matico, 79
Milano boreal, 22
Milano pico garfio, 22
Milano plumizo, 23
Monterita cabeza negra, 74
Monterita de collar, 74
Mosqueta boreal, 61
Mosqueta ojo dorado, 61
Ñacurutú, 35
Ñanday, 32
Paloma turca, 30
Palomita escamada, 29
Pepitero chico, 72
Pepitero de collar, 72
Perdiz chaqueña, 19
Perdiz chica, 19
Perdiz del monte, 18
Picaflor bronceado, 40
Picaflor de barbijo, 39
Picaflor verde, 39
Picapalo colorado, 51
Pijuí cola parda, 45
Pijuí espinosa, 45
Pijuí frente gris, 44
Piojito picudo, 60
Piojito silbón, 56
Piojito trinador, 58
Piojito vientre blanco, 57
Pitiayumi, 78
Pitogüé rayado, 63
Ratona pecho ocre, 69
Reinamora grande, 77
Rey del bosque, 77
Saría patas negras, 29
Saría patas rojas, 28
Soldadito, 73
Suirirí pico corto, 60
Suirirí real, 64
Suirirí vientre blanco, 57
Tacuarita azul, 70
Taguató común, 25
Tataupa listado, 18
Tijereta, 65
Torcaza, 31
Tortolita picuí, 30
Trepador gigante, 49
Tuquito gris, 64
Tuquito rayado, 63
Urraca común, 68
Urraca morada, 68
Vencejo de tormenta, 38
Viudita chaqueña, 62
Volatinero, 75
Zorzal mandioca, 70

INDICE DE NOMBRES EN GUARANI

Aka'ê hû, 68	Mbyju'i mbopi, 38
Aka'ê para, 68	Ñacurutú, 35
Añumby'i, 46	Ñakyrá'i, 61
Añumby'i, 47	Ñandái, 32
Arapasu guasu, 50	Ñendai, 32
Arapasu juru karapâ, 51	Ogaraity chaco, 44
Arapasu Ka'atî, 50	Parakáu, 33
Arapasu ñu, 49	Piu piu, 54
Arapasu pytâmi, 49	Pykasuro, 30
Chakuru para, 41	Pyku'i, 30
Che oro para, 52	Pyku'i pini, 29
Che tu'i, 44	Pyti'ajumi, 78
Chikli, 45	Sarîa hû, 29
Chivi chivi, 74	Sarîa pytâ, 28
Chiviro, 67	Sipiruru mi, 57
Chôcho, 62	Sipiruru pyti'a ju, 60
Choe, 79	Sorototo, 48
Guarani, 79	Sui sui, 23
Guîriri, 47	Suida chacol, 36
Guyra ka'i, 59	Suiriri guasu, 64
Guyra Karaguataty, 45	Suiriri hûo, 64
Guyra káva, 56	Suiriritî, 63
Guyra ñe'engatu, 71	Syi syi, 22
Guyra paja, 40	Tacoita, 59
Guyra pepoasakati, 71	Taguato hovy apiratî, 23
Guyra pyta'i, 76	Taguato hovy, 24
Guyra tata, 62	Taguato hû, 26
Guyra'i ñu, 55	Taguato'i, 27
Guyratañe , 77	Tiri tiri, 42
Guyraû chorê, 78	Toutou, 34
Havía kapi'i kua chaco, 46	Tuguái jetapa, 65
Havía korochire, 70	Tuja puka, 34
Havía tyvyta, 72	Tuju, 75
Inambu kogoe, 18	Vichi vichi para, 63
Inambu sîsî, 18	Vira vira, 72
Jakarimi, 75	Viro'o guasu, 53
Jaku karaguata, 20	Ykua, 66
Jeruti, 31	Ynambu apiratî, 20
Juruviara, 67	Ynambu boli, 19
Kai kai, 77	Ynambu'i, 19
Kavure, 35	Yndaje, 25
Kavure'i, 36	Ypekû akâ pytâ, 43
Kiri kiri guasu, 28	Ypekû hû, 43
Kiri kiri'i, 27	Ypekû mbatara, 42
Kuarahy avá, 40	Ypekû ne'i, 41
Kuârekra, 66	Yryvu akâ virâi, 21
Kuchu'i guy guy, 38	Yryvu ruvicha, 21
Kuruirusu, 69	Yvyja'u mi, 37
Kurukuturi, 25	
Luirivevu, 37	
Mainumby hovyû, 39	
Mainumby jetapa, 39	
Maitaka, 33	
Makagua, 26	
Mbairari, 31	
Mbatara guasu, 51	
Mbatara, 53	
Mbatara, 54	
Mburika mondoa, 55	
Mbyju'l jetapa, 69	

INDICE DE NOMBRES EN INGLES

Alder Flycatcher, 61
Amazonian Motmot , 40
American Kestrel , 27
Aplomado Falcon, 28
Barn Swallow, 69
Barred Antshrike , 52
Bay-winged Hawk, 24
Black-backed Grosbeak, 77
Black-bellied Antwren, 54
Black-bodied Woodpecker, 43
Black-capped Warbling-Finch, 74
Black-legged Seriema, 29
Blue-black Grassquit, 75
Blue-crowned Parakeet, 32
Blue-tufted Starthroat, 39
Bolivian Slaty Antshrike *Thamnophilus sticturus*, 53
Brown Cacholote, 48
Brown-crested Flycatcher, 66
Brushland Tinamou, 18
Chaco Chachalaca, 20
Chaco Eagle, 23
Chaco Earthcreeper, 48
Chaco Owl, 36
Chalk-browed Mockingbird, 71
Checkered Woodpecker, 42
Cinereous Tyrant, 62
Common Nighthawk, 37
Crane Hawk, 24
Cream-backed Woodpecker, 43
Creamy-bellied Trush, 70
Crested Gallito, 55
Crested Hornero, 44
Crowned Slaty-flycatcher *Griseo*, 64
Dark-billed Cuckoo, 34
Dinelli's Doradito, 58
Eared Dove, 31
Fawn-breasted Wren, 69
Ferruginous Pygmy-Owl, 36
Finch, 73
Fork-tailed Flycatcher, 65
Giant Antshrike, 51
Gilded Sapphire, 40
Glittering-bellied Emerald, 39
Golden-billed Saltator, 72
Golden-winged Cacique, 79
Greater Wagtail-Tyrant, 59
Gray-crowned Tyrannulet, 58
Great Antshrike, 52
Great Horned Owl, 35
Great Rufous Woodcreeper, 49
Hook-billed Kite, 22
King Vulture, 21
Large Elaenia, 56
Lark-like Brushrunner, 47
Laughing Falcon, 26
Little Nightjar, 38
Little Thornbird, 47
Many-colored Chaco-Finch, 72
Masked Gnatcatcher, 70
Mississippi Kite, 22
Nanday Parakeet, 32
Narrow-billed Woodcreeper, 50
Olivaceous Woodcreeper, 49
Olive-crowned Crescentchest, 55
Orange-backed Troupial, 79
Pale-breasted Spinetail, 45
Pauraque, 37
Pearly-vented Tody-Tyrant, 61
Picazuro Pigeon, 30
Picui Ground-Dove, 30
Plain Tyrannulet, 60
Plumbeous Kite, 23
Plush-crested Jay, 68
Purplish Jay, 68
Quebracho Crested-Tinamou, 20
Red-billed Scythebill, 51
Red-crested Finch, 76
Red-eyed Vireo, 67
Red-legged Seriema, 28
Ringed Warbling-Finch, 74
Roadside Hawk, 25
Rufous Casiornis, 65
Rufous-browed Peppershrike, 67
Rufous-fronted Thornbird, 46
Saffron Finch, 75
Scaled Dove, 29
Scaly-headed Parrot, 33
Scimitar-billed Woodcreeper, 50
Short-billed Canastero, 46
Sick's Swift, 38
Solitary Black Cacique, 78
Sooty-fronted Spinetail, 44
Southern Beardless-tyrannulet, 56
Southern Scrub-flycatcher, 60
Spot-backed Puffbird, 41
Spot-winged Falconet, 27
Spotted Nothura, 19
Streaked Flycatcher, 63
Stripe-backed Antbird, 54
Stripe-capped Sparrow, 73
Suiriri Flycatcher, 57
Swainson's Flycatcher, 66
Tawny-crowned Pygmy-Tyrant, 59
Tropical Kingbird, 64
Tropical Parula, 78
Tropical Screech-Owl , 35
Turkey Vulture, 21
Turquoise-fronted Amazon, 33
Ultramarine Grosbeak, 77
Undulated Tinamou, 18
Variable Antshrike, 53
Variable Oriole, 80
Variegated Flycatcher, 63
Vermilion Flycatcher, 62
White-banded Mockingbird, 71
White-barred Piculet, 41
White-bellied Nothura, 19
White-bellied Seedeater, 76
White-bellied Tyrannulet, 57
White-fronted Woodpecker, 42
White-lore Spinetail , 45
White-tailed Hawk, 25
White-tipped Dove, 31
Yellow-billed Cuckoo, 34
Zone-tailed Hawk, 26



CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA



GUÍA DE LAS *Aves* DEL CHACO SECO PARAGUAYO

Esta Guía de campo contiene información sobre 125 especies de las aves más representativas del Chaco seco paraguayo. Esta compuesto por fichas por especies que incluyen fotografías, probabilidad de hallazgo, datos de su estado de conservación nacional e internacional, tipo de hábitat, ocurrencia, alimentación, distribución y comportamiento social. Fue elaborado por el equipo técnico de Guyra Paraguay, gracias a los fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEI. Esta Guía se desarrolla entonces como producto del proyecto “Evaluación de la importancia de los Parques Nacionales del Chaco seco como refugio natural para las aves amenazadas y endémicas del Paraguay (14-INV-209)”, buscando fomentar el conocimiento, el estudio y conservación de las aves del Paraguay.

La Guía de Aves del Chaco seco paraguayo complementa 20 años de publicaciones de Guyra Paraguay, continuando con el objetivo de generar materiales científicos de consulta para dar a conocer y concientizar sobre la rica avifauna de nuestro país.



GUYRA
PARAGUAY

ISBN: 978-99967-653-4-6



9 789996 765346

Miembros de:

